



Arzneimittel

Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren
D-Campher/Eucalyptusöl/Gereinigtes Terpentinöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv beachten?
3. Wie ist Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv und wofür wird sie angewendet?

Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv ist ein Arzneimittel zur äußerlichen Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen bei nicht-entzündlichen, rheumatischen Erkrankungen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv beachten?

Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Campher, Terpentinöl, Eucalyptusöl, Cineol (ein Hauptbestandteil von Eucalyptusöl) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).
- auf geschädigter Haut, z. B. bei Verbrennungen und Verletzungen.
- bei Bronchialasthma.
- bei Keuchhusten.
- bei Pseudokrupp.
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Wenden Sie Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv nicht im Gesicht, auf Schleimhäuten, offenen Wunden, Entzündungen oder Ekzemen an. Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen.

Waschen Sie nach der Anwendung von Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv gründlich Ihre Hände.

Achten Sie darauf, dass Kinder die eingeriebenen Hautpartien nicht mit ihren Händen berühren.

Kinder

Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv darf nicht bei Kindern unter 2 Jahren angewendet werden.

Die Anwendung bei Kindern zwischen 2 und 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Anwendung von Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Es wurden keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie ist Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren reiben die betroffenen Körperstellen 2–3-mal täglich mit einem ca. 5 cm langen Salbenstrang ein.

Tragen Sie die Salbe nicht großflächig, sondern nur lokal begrenzt auf.

Wenn Sie eine größere Menge von Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv angewendet haben, als Sie sollten

Die versehentliche Einnahme (Verschlucken) größerer Mengen von Eucalyptusöl kann erhebliche Beschwerden (z.B. Erbrechen, Bauchschmerzen, Benommenheit, Atemnot) hervorrufen. In diesem Fall sollten Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung setzen, auch wenn noch keine Beschwerden aufgetreten sind. Dies gilt insbesondere, wenn ein kleines Kind größere Mengen Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv verschluckt hat. Milch oder Alkohol sollten im Fall eines versehentlichen Verschlucks nicht getrunken werden, da diese die Aufnahme der Wirkstoffe von Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv in das Blut fördern können.

Wenn Sie die Anwendung von Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Fahren Sie mit der Anwendung wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. nach Anweisung Ihres Arztes fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)

Allergische Symptome (z.B. Hautausschläge, Kontaktkzeme, Rötung, Blasenbildung, Nesselsucht, Schwellungen), Verkrampfung der Atemmuskulatur mit Atemnot (Bronchospasmus), Hustenreiz, Vergiftungsscheinungen (z. B. Nierenversagen, Schäden des zentralen Nervensystems) infolge äußerlicher, großflächiger Anwendung.

Wenn bei Ihnen Hautrötungen, -brennen oder -reizungen (ggf. verbunden mit Juckreiz) auftreten, spülen Sie die betroffenen Stellen mit Wasser ab. Beenden Sie beim Auftreten solcher Beschwerden die Anwendung von Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv und suchen Sie ggf. Ihren Arzt auf.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

DE-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Tubenfatz nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/ärzneimittelsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv enthält

– Die Wirkstoffe sind: Gereinigtes Terpentinöl, D-Campher und Eucalyptusöl. 100 g Salbe enthalten 25,0 g Gereinigtes Terpentinöl, 10,0 g D-Campher und 10,0 g Eucalyptusöl.

– Der sonstige Bestandteil ist: Weißes Vaselin.

Wie Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv aussieht und Inhalt der Packung

Schmerz- und Rheuma-Salbe intensiv ist eine weiß-durchscheinende Salbe. Sie ist in Tuben mit 20 g, 50 g, 100 g und 100 ml Salbe erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Euro Vital Pharma GmbH, Borsteler Chaussee 47, DE-22453 Hamburg

Vertrieb durch

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe, Tel. 0800 3658633

Hersteller

Euro Vital Pharma GmbH, Elisabeth-Schumacher-Straße 54 – 56, DE-04328 Leipzig

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2021.