



**Gebrauchsinformation:
Information für Anwender**

**Arzneimittel
Franzbranntwein mit Campher**

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 15 Jahren

Campher/Ethanol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Franzbranntwein mit Campher und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein mit Campher beachten?
3. Wie ist Franzbranntwein mit Campher anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Franzbranntwein mit Campher aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST FRANZBRANNTWEIN MIT CAMPHER UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?

Franzbranntwein mit Campher wird traditionell angewendet zur Förderung der Hautdurchblutung, z. B. zur unterstützenden Behandlung von Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen.

Diese Anwendung stützt sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in dem Anwendungsgebiet.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FRANZBRANNTWEIN MIT CAMPHER BEACHTEN?

Franzbranntwein mit Campher darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Campher, Ethanol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie Keuchhusten, Asthma bronchiale oder andere Atemwegserkrankungen haben, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen.
- wenn Sie eine Hauterkrankung haben.
- auf geschädigter Haut, z. B. bei Verletzungen, Entzündungen, Infektionen oder Ekzemen.
- auf Schleimhäuten.
- im Bereich der Augen.
- bei einer durch Diabetes verursachten Schädigung kleiner Blutgefäße (diabetische Mikroangiopathie).
- bei einem Verschluss der Blutgefäße in den Beinen (periphere venöse oder arterielle Insuffizienz).
- bei Kindern unter 12 Jahren, da die Konzentration nicht geeignet ist, sowie bei Säuglingen und Kleinkindern (Gefahr eines Stimmritzenkramps).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit einer Rötung oder einer Schwellung einhergehen, bei andauernden Beschwerden oder bei starken Schmerzen sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Achten Sie darauf, dass Kinder mit ihren Händen nicht mit den mit dem Arzneimittel eingeriebenen Hautpartien in Kontakt gelangen.

Kinder und Jugendliche

Franzbranntwein mit Campher darf nicht bei Säuglingen und Kleinkindern angewendet werden, da beschrieben ist, dass es in seltenen Fällen zu einem Atemstillstand bei einem Stimmritzenkrampf nach Inhalation ätherischer Öle gekommen ist.

Franzbranntwein mit Campher darf nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden, da die Konzentration nicht geeignet ist.

Die Anwendung von Franzbranntwein mit Campher bei Jugendlichen unter 15 Jahren wird nicht empfohlen, da hierfür keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

Anwendung von Franzbranntwein mit Campher zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Franzbranntwein mit Campher sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Anwendung von Franzbranntwein mit Campher während der Schwangerschaft wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. Während der Stillzeit sollte eine großflächige oder über längere Zeit dauernde Anwendung vermieden werden. Um einen direkten Kontakt des Säuglings mit Franzbranntwein mit Campher zu vermeiden, darf Franzbranntwein mit Campher in der Stillzeit nicht an der Brust angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Franzbranntwein mit Campher enthält Ethanol (Alkohol) und einen Duftstoff mit Allergenen

Dieses Arzneimittel enthält 2,69 g Alkohol (Ethanol) pro 5 ml Lösung entsprechend 53,72 g/100 g (53,72 % w/w). Aufgrund der hohen Ethanol-Konzentration ist dieses Arzneimittel brennbar. Es sollte nicht in der Nähe von offenen Flammen, technischen Geräten (z. B. Haartrockner) oder beim Anzünden von Zigaretten angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Eugenol, D-Limonen und Linalool. Eugenol, D-Limonen und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.

3. WIE IST FRANZBRANTWEIN MIT CAMPHER ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren reiben die zu behandelnde Stelle 3 - 5-mal täglich dünn mit ca. 1 - 5 ml Lösung ein.

Art der Anwendung

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht einnehmen.

Franzbranntwein mit Campher wird dünn auf die betroffenen Körperpartien aufgetragen und leicht eingerieben.

Vor Anlegen eines Verbandes sollte die Lösung einige Minuten auf der Haut eintrocknen. Von der Anwendung eines luftdichten Verbandes (Okklusivverband) wird abgeraten. Eine zeitgleiche Kryotherapie wird aufgrund der möglichen zusätzlichen Hautreizung nicht empfohlen. Eine großflächige Anwendung wird nicht empfohlen.

Dauer der Anwendung

Wenden Sie Franzbranntwein mit Campher ohne ärztlichen Rat nicht länger als 4 Tage an.

Bei Beschwerden, die länger als 3 Tage anhalten oder sich verschlimmern, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Franzbranntwein mit Campher angewendet haben, als Sie sollten

Bei Überschreitung der empfohlenen Dosierung bei äußerlicher Anwendung sollte die Lösung wieder entfernt und mit Wasser abgespült werden.

Bei äußerlicher Anwendung von wesentlich zu großen Mengen oder versehentlicher Einnahme (Verschlucken) von Franzbranntwein mit Campher ist der Arzt zu benachrichtigen. Dieser kann entsprechend der Art und Schwere der Beschwerden über die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen entscheiden. Ein spezifisches Antidot existiert nicht. Auf keinen Fall sollten Milch oder alkoholische Getränke getrunken werden, da dies die Aufnahme von ätherischen Ölen fördern kann.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Sollten Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bei sich beobachten, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Arzt, der dann festlegt, wie weiter zu verfahren ist.

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

Lokale Hautreaktionen, wie z. B. Hautrötungen, Jucken, Brennen oder Hauausschlag auch mit Pustel- oder Quaddelbildung.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)

Überempfindlichkeitsreaktionen bzw. lokale allergische Reaktionen (Kontaktdermatitis).

Seiten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)

Hustenreiz, ausgelöst durch das Einatmen von ätherischen Ölen.

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)

Bei entsprechend veranlagten Patienten Atemwegsverengungen (Bronchospasmen).

Der hohe Gehalt an Alkohol kann die Haut austrocknen.

Wenn Franzbranntwein mit Campher großflächig auf die Haut aufgetragen und über einen längeren Zeitraum angewendet wird, ist das Auftreten von Nebenwirkungen, die ein bestimmtes Organssystem oder auch den gesamten Organismus betreffen, wie sie unter Umständen nach systemischer Anwendung Campher-haltiger Arzneimittel auftreten können, nicht auszuschließen.

Beim Auftreten von Hautrötungen, -brennen oder -reizung sind die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser abzuspülen.

Bei Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion soll die Behandlung abgebrochen und Franzbranntwein mit Campher nicht nochmals angewendet werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST FRANZBRANTWEIN MIT CAMPHER AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Etikett nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Die Flasche fest verschlossen halten.

Dieses Arzneimittel ist brennbar. Vor Feuer und Flammen schützen.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/ärzneimittelerntersorgung.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**Was Franzbranntwein mit Campher enthält**

- Die Wirkstoffe sind: Campher und Ethanol. 100 g Lösung enthalten 2 g Campher und 53,72 g Ethanol 96,6 % (V/V).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Latschenkiefernöl, Gereinigtes Wasser.

Wie Franzbranntwein mit Campher aussieht und Inhalt der Packung

Franzbranntwein mit Campher ist eine klare bis sehr schwach opaleszierende Lösung von arteigenem Geruch und in einer Flasche mit 500 ml Lösung erhältlich.

Vertrieb durch:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Hersteller:

Euro Vital Pharma GmbH
Elisabeth-Schumacher-Straße 54 – 56
DE-04328 Leipzig

60014916-250-04