



Halsschmerz-Lutschtabletten mit Kirsch-Geschmack – Ohne Zuckerzusatz

Bei Halsschmerz, Hustenreiz und Heiserkeit

Medizinprodukt

Zusammensetzung:
Isländisch Moos Extrakt, Malvenextrakt, Vitamin C, Isomalt, Menthol, Sucralose, Kirscharoma, natürlicher Farbstoff.

Anwendungsgebiet:
Halsschmerz Lutschtabletten werden angewendet zur physikalischen Therapie von Husten, Halsschmerzen, und Heiserkeit (z. B. bei Erkältungen) sowie zur Unterstützung der natürlichen Befeuchtung der Mund- und Rachenschleimhaut und sind für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Anwendungshinweise:
Halsschmerz Lutschtabletten können je nach Bedarf mehrmals täglich jede Stunde angewendet werden. Die Tagesdosis von 6 Lutschtabletten sollte nicht überschritten werden. Bei Kindern (6 –16 Jahre) sollte die Tagesdosis von max. 3 Lutschtabletten nicht überschritten werden. Falls nach 7 Tagen keine Besserung eingetreten ist, sollte der Rat eines Arztes oder Apothekers eingeholt werden.

Wann dürfen Halsschmerz Lutschtabletten nicht angewendet werden?
Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen das Präparat oder eines seiner Bestandteile oder einem Verdacht dürfen Halsschmerz Lutschtabletten nicht angewendet werden. Bei entsprechend sensibilisierten Personen können durch Menthol Überempfindlichkeitsreaktionen ausgelöst werden. Es liegen keine Untersuchungen zur Anwendung während der Schwangerschaft vor, weshalb Halsschmerz Lutschtabletten erst nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden sollten. Bitte nehmen Sie Halsschmerz Lutschtabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern/Zuckeraustauschstoffen leiden. In sehr seltenen Fällen kann es – bedingt durch die Zuckeraustauschstoffe Isomalt und Sucralose – bei übermäßigem Verzehr zu einer abführenden Wirkung kommen.

Können Halsschmerz Lutschtabletten mit anderen Mitteln verwendet werden?
Eine Beeinflussung der Wirksamkeit anderer Arzneimittel ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Halsschmerz Lutschtabletten nicht bekannt. Dennoch sollten Halsschmerz Lutschtabletten nicht unmittelbar mit anderen Medikamenten oder Produkten des täglichen Bedarfs zusammen eingenommen werden. Auf einen ausreichenden Zeitabstand zwischen den jeweiligen Anwendungen ist zu achten.

Welche unerwünschten Nebenwirkungen können Halsschmerz Lutschtabletten haben?
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erwarten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information: Mai 2021

🇭🇺 Torokfájás elleni szopogatótabletta, cseresznyeízű – hozzáadott cukor nélkül
Torokfájás, köhögési inger és rekedtség esetén
Orvostechikai eszköz

Összetétel:
izlandi zuzmó kivonat, mályvakivonat, C-vitamin, izomalt, mentol, szukralóz, cseresznyearoma, természetes színezék.

Alkalmazási terület:
A torokfájás elleni szopogatótabletta köhögés, torokfájás és rekedtség (pl. megfázás esetén) fizioterápiás kezelésére, valamint a száj- és garatnyálkahártya természetes nedvesítésének elősegítésére szolgál, felnőttek és 6 éves kor feletti gyermekek számára.

Alkalmazási tudnivalók:
A torokfájás elleni tablettát szükség szerint naponta többször is használható egyórás időközönként. Naponta legfeljebb 6 szopogatótablettát fogyasztható. Gyermekeknél (6–16 éves) a legfeljebb 3 tablettát napi adagot nem szabad túllépni. Ha 7 nap elteltével nincs javulás, kérje orvosa vagy gyógyszerész tanácsát.

220002594 02P0124 509 956091D

- Gebrauchsinformation: bitte aufmerksam lesen /**
- 🇭🇺 Használati útmutató: kérjük, olvassa el figyelmesen /
 - 🇨🇿 Návod k použití: pečlivě si jej přečtěte /
 - 🇸🇰 Návod na použitie: pozorne si ju, prosím, prečítajte /
 - 🇵🇸 Informacije o uporabi: skrbno preberite /
 - 🇷🇴 Instrucțiuni de utilizare: vă rugăm să îl citiți cu atenție /
 - 🇵🇱 Instrukcja używania: proszę uważnie przeczytać

Mikor nem használható a torokfájás elleni szopogatótabletta?
Ha ismert túlérzékenység áll fenn a készítménnyel vagy annak valamelyik összetevőjével szemben, vagy annak gyanúja merül fel, ne használja tovább a torokfájás elleni tablettát. A mentol túlérzékenységi reakciókat válthat ki azoknál, akik erre érzékenyek. A terhesség alatti alkalmazásra vonatkozóan nem végeztek vizsgálatokat, ezért a torokfájás elleni szopogatótablettát csak az orvossal folytatott konzultációt követően célszerű fogyasztani. Ha bizonyos cukrokra/cukorpótlókra érzékeny, csak orvosával vagy gyógyszerészével folytatott konzultációt követően használja a torokfájás elleni tablettát.

Nagyon ritka esetekben – az izomalt és a szukralóz cukorhelyettesítők miatt – a túlzott fogyasztás hashajtó hatású lehet.

Alkalmazható-e a torokfájás elleni szopogatótablettát más szerekekkel együtt?
Rendeltetésszerű használat esetén a torokfájás elleni tablettát más gyógyszerek hatékonyságára gyakorolt hatása nem ismert. Ennek ellenére a torokfájás elleni tablettát nem célszerű más gyógyszerekkel vagy a napi rendszerességgel szedendő termékekkel együtt bevenni. Az egyes alkalmazások között elegendő időt kell hagyni.

Milyen nemkívánatos mellékhatásai lehetnek a torokfájás elleni tablettának?
Rendeltetésszerű használat esetén nem várható nemkívánatos mellékhatás.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tájékoztató állapota: 2021. május

🇨🇿 Pastilky proti bolesti v krku s třešňovou příchutí – bez přidaného cukru
Při bolestech v krku, dráždivém kašli a chrapotu
Zdravotnický prostředek

Složení:
Extrakt z islandského mechu, extrakt ze slézu, vitamin C, isomalt, mentol, sukralóza, třešňové aroma, přírodní barvivo.

Oblast použití:
Pastilky proti bolesti v krku se používají k fyzikální terapii kašle, bolesti v krku a chrapotu (např. při nachlazení) a dále k podpoře přirozeného zvlhčování sliznic úst a krku. Jsou vhodné pro dospělé a děti od 6 let.

Návod k použití:
Pastilky proti bolesti v krku lze používat několikrát denně – podle potřeby každou hodinu. Denní dávka 6 pastilek by neměla být překročena. U dětí (6–16 let) by neměla být překročena denní dávka max. 3 pastilky. Pokud po 7 dnech nedojde ke zlepšení, je třeba vyhledat lékaře nebo lékárníka.

Kdy by se pastilky proti bolesti v krku neměly používat?
Nepoužívejte pastilky na bolest v krku, pokud jste precitlivělý na přípravek či na některou z jeho složek anebo jestliže máte podezření, že jste precitlivělý. U sensiblizovaných osob může mentol vyvolat reakce precitlivělosti. Nebyly provedeny žádné studie o užívání pastilek proti bolesti v krku během těhotenství, a proto by se měly užívat pouze po konzultaci s lékařem. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů/náhražek cukrů, neužívejte pastilky proti bolesti v krku, dokud se neporadíte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ve velmi vzácných případech může mít nadměrná konzumace za následek projíímavý účinek způsobený náhražkami cukru isomaltem a sukralózou.

Je možné pastilky na bolest v krku používat spolu s jinými léky?
Není známo, že by účinnost jiných léků byla ovlivněna, pokud se pastilky proti bolesti v krku používají podle návodu. Pastilky proti bolesti v krku by se však neměly přímo užívat spolu s jinými léky nebo produkty denní potřeby. Dbejte na to, aby mezi jednotlivými aplikacemi uplynul dostatečný časový odstup.

Jaké jsou nežádoucí vedlejší účinky pastilek proti bolesti v krku?
Pokud se pastilky používají podle pokynů, nenastanou nežádoucí vedlejší účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Stav informací: květen 2021

🇸🇰 Cmúfacie pastilky proti bolestiam hrdla s čerešňovou príchuťou – Bez pridaného cukru
Pri bolestiach v hrdle, dráždení na kašeľ a pri zachrípnutí
Zdravotnícka pomôcka

Zloženie:
Extrakt z islandského lišajníka, extrakt zo slezu, vitamín C, izomalt, mentol, sukralóza, čerešňová aróma, prírodné farbivo.

