



Medizinprodukt

Schonendes Abführmittel

Mivolis Schonendes Abführmittel ist ein modernes, besonders schonend und zuverlässig wirkendes Präparat gegen Verstopfung.

Anwendungsgebiet: Verstopfung (Obstipation)

Zusammensetzung: 1 Beutel enthält als wirksamen Bestandteil:

Macrogol (PEG) 3350	13,125 g	Natriumhydrogencarbonat	0,179 g
Natriumchlorid	0,351 g	Kaliumchlorid	0,046 g

Sonstige Bestandteile: Sorbitol, Acesulfam-Kalium, Aroma.

Inhalt: Packung mit 20 Beuteln mit je 14,4 g Pulver zur Herstellung einer Trinklösung

Anwendung: Den Inhalt eines Beutels in 125 ml (1/8 Liter) Wasser auflösen und trinken. Vor Einnahme frisch zubereiten, darf nicht mit anderen Lösungen, Getränken oder Zusätzen vermischt werden.

Gegenanzeigen: Keine Einnahme von **Mivolis Schonendes Abführmittel** bei:

- schweren entzündlichen Darmerkrankungen (wie z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und toxisches Megakolon)
- Darmverengung oder Darmverschluss
- Gefahr eines Darmdurchbruchs

Schwangerschaft und Stillzeit: Es besteht keine Erfahrung bezüglich der Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit, sodass **Mivolis Schonendes Abführmittel** nur nach sorgfältiger Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden sollte.

Kinder: Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen über die Einnahme von **Mivolis Schonendes Abführmittel** bei Kindern vor. Daher wird die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.

Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise: Bei Symptomen, die auf eine Verschiebung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushaltes hinweisen, wie z. B. Ansammlung von Gewebsflüssigkeit (Ödeme), Atemnot, zunehmende Müdigkeit, Körperwasserverlust (Dehydratation), Herzversagen, sollte die Einnahme von **Mivolis Schonendes Abführmittel** sofort beendet, Elektrolytmessungen durchgeführt und bei Abweichungen entsprechende Gegenmaßnahmen vorgenommen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Resorption und somit die Wirkung von anderen oral eingenommenen Arzneimitteln bei gleichzeitiger Einnahme von **Mivolis Schonendes Abführmittel** reduziert ist. Als Vorsichtsmaßnahme sollten daher eine Stunde vor, während und eine Stunde nach der Einnahme von **Mivolis Schonendes Abführmittel** keine anderen Medikamente oral eingenommen werden. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie derzeit andere Medikamente einnehmen oder kurz zuvor eingenommen haben. Dies gilt auch für rezeptfrei erhältliche Medikamente.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: **Mivolis Schonendes Abführmittel** erhöht die Löslichkeit von Stoffen, die in Alkohol löslich und in Wasser relativ unlöslich sind. Daher besteht die theoretische Möglichkeit, dass die Aufnahme solcher Arzneistoffe vorübergehend verringert wird.

Dosierungsanleitung: Falls vom Arzt nicht anders verordnet gelten folgende Dosierungsempfehlungen: Erwachsene, Jugendliche und ältere Personen: Bei Verstopfung 1–2 Mal täglich den Inhalt eines Beutels auflösen und trinken. Die Dauer der Behandlung sollte zwei Wochen nicht überschreiten. Bei Bedarf kann **Mivolis Schonendes Abführmittel** wiederholt eingesetzt werden. Eine längerfristige Anwendung kann bei schwerer chronischer oder hartnäckiger (refraktärer) Verstopfung notwendig sein.

Nebenwirkungen: Magen-Darm-Beschwerden wie Aufblähungen, Bauchschmerzen, vermehrte Darmgeräusche, Übelkeit und leichte Durchfälle (besonders zu Beginn). Vereinzelt kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

Hinweise bei Anwendungsfehlern und Überdosierung: Wenn Sie eine größere Menge als die vorge-

sehene Dosierung eingenommen haben, können dadurch in verstärktem Maße Nebenwirkungen auftreten. In der Regel klingen diese bald wieder ab. Bei starken Schmerzen, Aufblähungen oder schweren Durchfällen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Wenn Sie die Einnahme vergessen haben: Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Anwendung mit der vorgesehenen Dosierung fort.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Geöffnete oder beschädigte Beutel nicht verwenden.

Verfalldatum: Siehe Faltschachtel und Beutel. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden.

LOT Chargennummer und Verfalldatum sind auf dem Einmal-Behältnis und der Faltschachtel-Oberseite aufgebracht.

ⓘ Dispositivo medico

Mivolis lassativo delicato

Mivolis lassativo delicato è un moderno preparato contro la stitichezza, particolarmente delicato e sicuro.

Indicazioni: Stitichezza (costipazione)

Composizione: 1 bustina contiene come principio attivo:

Macrogol (PEG) 3350	13,125 g	Bicarbonato di sodio	0,179 g
Cloruro di sodio	0,351 g	Cloruro di potassio	0,046 g

Altri ingredienti: sorbitolo, acesulfame di potassio, aroma

Contenuto: confezione di 20 bustine contenenti ciascuna 14,4 g di polvere per la preparazione di una soluzione da bere.

Modo d'uso: Disciogliere il contenuto di una bustina in 125 mL (1/8 di litro) di acqua e bere. Preparare la soluzione subito prima dell'assunzione, non mescolare con altre soluzioni, bevande o additivi.

Controindicazioni: Non assumere **Mivolis lassativo delicato** in caso di:

- stenosi o occlusione intestinale
- pericolo di perforazione intestinale
- gravi malattie intestinali infiammatorie (quali ad es. morbo di Crohn, colite ulcerosa, megacolon tossico)

Gravidanza e allattamento: Non si hanno esperienze in merito all'impiego durante la gravidanza e l'allattamento, per cui **Mivolis lassativo delicato** deve essere assunto dopo attenta valutazione del medico.

Bambini: Non sono disponibili dati sufficienti circa l'assunzione di **Mivolis lassativo delicato** da parte dei bambini. Pertanto non se ne consiglia l'impiego nei bambini di età inferiore ai 12 anni.

Misure precauzionali e avvertenze speciali: In presenza di sintomi che indicano un'alterazione dell'equilibrio idroelettrolitico, ad es. raccolta di fluido nei tessuti (edema), dispnea, spossatezza crescente, perdita di fluidi corporei (disidratazione), insufficienza cardiaca, interrompere immediatamente l'assunzione di **Mivolis lassativo delicato**, eseguire una misurazione degli elettroliti e adottare le contromisure del caso se si riscontrano valori non conformi.

In caso di assunzione concomitante di **Mivolis lassativo delicato**, l'assorbimento e quindi l'effetto di altri farmaci assunti per via orale potrebbe diminuire. Per precauzione, quindi, è necessario evitare l'assunzione di altri farmaci per via orale un'ora prima, durante e un'ora dopo l'assunzione di **Mivolis lassativo delicato**. Chiedere al proprio medico o farmacista se si stanno assumendo o se di recente si hanno assunto altri farmaci, anche quelli acquistabili senza ricetta.

Interazione con altri prodotti: **Mivolis lassativo delicato** aumenta tuttavia la solubilità di sostanze solubili in alcol e relativamente insolubili in acqua. Esiste pertanto la possibilità teorica che l'assunzione di tali prodotti debba essere temporaneamente ridotta.

60005356

Posologia: Salvo diversa prescrizione medica, le dosi raccomandate sono le seguenti: adulti, ragazzi e anziani: in caso di stitichezza, assumere il contenuto di una bustina 1–2 volte al giorno dopo averlo disciolto in acqua. La durata del trattamento non deve superare le due settimane. All'occorrenza, **Mivolis lassativo delicato** può essere impiegato più volte. In caso di grave stitichezza cronica o persistente (refrattaria) può essere necessario un utilizzo prolungato.

Effetti collaterali: Disturbi gastrointestinali quali gonfiori, dolori addominali, frequenti rumori peristaltici, nausea e diarrea leggera (specialmente all'inizio). In casi isolati possono verificarsi reazioni di ipersensibilità. Informare il proprio medico o farmacista se si avvertono effetti collaterali non elencati nel presente foglietto illustrativo.

Avvertenze su errori di utilizzo e sovradosaggio: Se si assume una quantità superiore alla dose prevista, potrebbero verificarsi effetti collaterali più intensi. Di norma tali effetti scompaiono rapidamente. In caso di forti dolori, gonfiori o diarrea grave, rivolgersi al proprio medico.

Se si è dimenticato di assumere il medicamento: Non assumere una dose doppia, ma proseguire l'impiego con il dosaggio previsto.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non conservare a temperature superiori a 25 °C. Non utilizzare le bustine già aperte o danneggiate. Data di scadenza: vedere la scatola pieghevole e la bustina. Non utilizzare oltre la data di scadenza. Informazioni aggiornate a: 08/2022

LOT Il numero di lotto e la data di scadenza sono stampati sul contenitore monouso e sul lato superiore della scatola pieghevole.

Ⓢ Medicinski pripomoček

Nežno odvajalno sredstvo Mivolis

Nežno odvajalno sredstvo Mivolis je sodoben, še posebej nežen in zanesljivo učinkovit pripravek proti zaprtju.

Področje uporabe: Zaprtje (obstipacija)

Sestava: 1 vrečka vsebuje učinkovino:			
makrogol (PEG) 3350	13,125 g	natrijev hidrogenkarbonat	0,179 g
natrijev klorid	0,351 g	kalijev klorid	0,046 g

Pomožne sestavine: sorbitol, kalijev acesulfam, aroma

Vsebina: pakiranje z 20 vrečkami po 14,4 g praška za pripravo raztopine za pitje.

Uporaba: Vsebino ene vrečke raztopite v 125 ml (1/8 litra) vode in popijte.

Pripravite sveže pred zaužitjem, ne mešajte z drugimi raztopinami, pijalčami ali dodatki.

Kontraindikacije: **Nežnega odvajalnega sredstva Mivoli** ne uporabljajte pri:

- stenoz ali obstrukciji črevesja,
- nevarnosti perforacije črevesja,
- hudi vnetni črevesni bolezni (kot so Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis, toksični megakolon).

Nosečnost in dojenje: Glede uporabe med nosečnostjo in dojenjem ni izkušenj, zato **nežno odvajalno sredstvo Mivolis** uporabljajte le po skrbnem premisleku zdravnika.

Otroci: Glede uporabe **nežnega odvajalnega sredstva Mivolis** pri otrocih ni dovolj izkušenj.

Zato uporaba pri otrocih, mlajših od 12 let, ni priporočljiva.

Previdnostni ukrepi in posebna navodila: V primeru simptomov, ki kažejo na spremembo ravnovesja tekočin in elektrolitov, kot so kopičenje tekočine v tkivih (edem), zadihanost, naraščajoča utrujenost, izguba vode v telesu (dehidracija) ali srčno popuščanje, je treba z jemanjem **nežnega odvajalnega sredstva Mivolis** takoj prenehati, opraviti meritve elektrolitov in v primeru odstopanj sprejeti ustrezne protikrepe.

Pri sočasnem jemanju medicinskega pripomočka **Nežno odvajalno sredstvo Mivolis** obstaja možnost, da se zmanjša resorpcija in s tem učinkovanje drugih zdravil, ki se jemljejo peroralno. Preventivno zato eno uro pred, med in po uporabi medicinskega pripomočka **Nežno odvajalno sredstvo Mivolis** ne smete peroralno vzeti nobenih drugih zdravil. Če trenutno jemljete ali ste pred kratkim jemali druga zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. To velja tudi za zdravila, ki so na voljo brez recepta.

Medsebojno delovanje z drugimi sredstvi: Vendar pa **nežno odvajalno sredstvo Mivolis** poveča topnost snovi, ki so topne v alkoholu in relativno netopne v vodi. Zato obstaja teoretična možnost, da se absorpcija takšnih zdravil začasno zmanjša.

Navodila za odmerjanje: Če zdravnik ne predpiše drugače, veljajo naslednja priporočila za odmerjanje: Odrasli, mladostniki in starejši: Pri zaprtju 1–2-krat na dan raztopite vsebino ene vrečke in popijte. Zdravljenje ne sme trajati več kot dva tedna. Po potrebi lahko **nežno odvajalno sredstvo Mivolis** uporabite večkrat. Pri hudem kroničnem ali trdovratnem (refraktornem) zaprtju bo morda potrebna dolgotrajnejša uporaba.

Neželeni učinki: Prebavni simptomi, kot so napihnjenost, bolečine v trebuhu, povečani črevesni zvoki, slabost in blaga driska (zlasti na začetku) V posameznih primerih se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije. Če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu, o tem obvestite zdravnika ali farmacevta.

Informacije v primeru napak pri uporabi in prevelikega odmerjanja: Če ste vzeli večjo količino od predvidenega odmerka, lahko to povzroči povečane neželene učinke. Ti praviloma kmalu izvenijo. V primeru hudih bolečin, napihnjenosti ali hude driske se posvetujte z zdravnikom.

Če ste odvajalo pozabili vzeti: Ne vzemite dvojnega odmerka, temveč nadaljujte z odmerjanjem po prvotnem razporedu.

Hranite nedostopno otrokom. Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte odprtih ali poškodovanih vrečk. Rok trajanja: glej škatlo in vrečko. Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti. Stanje informacij: 08.2022

LOT Številka serije in datum veljavnosti sta odtisnjena na vsebniku za enkratno uporabo in na vrhu škatle.

Ⓢ Zdravotniški prostredek

Mivolis šetrné projímadlo

Mivolis šetrné projímadlo je moderní, velmi šetrný a spolehlivý přípravek proti zácpě.

Oblast použití: zácpa (obstipace)

Složení: 1 sáček obsahuje jako účinnou složku:

makrogol (PEG) 3350	13,125 g	hydrogenuhlíčenat sodný	0,179 g
chlorid sodný	0,351 g	chlorid draselný	0,046 g

Další složky: sorbitol, acesulfam draselný, aroma

Obsah: Balení 20 sáčků po 14,4 g prášku pro přípravu roztoku k pití.

Použití: Obsah sáčku rozpustíte ve 125 ml (1/8 litru) vody a vypijte. Před užitím připravujte vždy čerstvý roztok, nemíchejte s jinými roztoky, nápoji ani přísadami.

Kontraindikace: **Mivolis šetrné projímadlo** neužívejte v případě:

- zúžení nebo neprůchodnosti střev
- nebezpečí protržení střevní stěny
- závažných zánětlivých střevních onemocnění (např. Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida nebo toxické megakolon)

Těhotenství a kojení: S užíváním **Mivolis šetrného projímadla** v těhotenství a během kojení nejsou žádné zkušenosti, proto by mělo být užíváno pouze po pečlivém zvážení lékařem.

Děti: S užíváním **Mivolis šetrného projímadla** u dětí zatím nejsou dostatečné zkušenosti. Proto se užívání u dětí do 12 let nedoporučuje.





