

free

ANGIN



- přečíst návod k použití LOT - číslo šarže



- skladování - omezení teploty



- použitelné do MD - zdravotnický prostředek



- nevystavujte slunečnímu záření

Tento návod k použití obsahuje důležité informace o výrobci a výrobku. Zdravotnický prostředek používejte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

FREEANGIN sprej s rakytníkovým olejem a přírodním extraktem z bylin (dále jen FREEANGIN sprej).

Složení: Rostlinný olej, rakytníkový olej (*Hippophae rhamnoides oil*), extrakt z listů šalvěje lékařské (*Salvia officinalis*), extrakt z květů měsíčku lékařského (*Calendula officinalis*), extrakt z heřmánku pravého (*Chamomilla recutita*), extrakt z listů máty peprné (*Mentha piperita*).

Mechanismus účinku: FREEANGIN sprej vytváří na povrchu sliznice dutiny ústní a hltanu olejovitý ochranný film, který brání pronikání mikroorganismů do lidského organismu.

Podmínky skladování: Skladujte na suchých místech, která jsou chráněna před přímým působením slunečních paprsků při teplotě od 15 °C do 25 °C.

Určený účel použití: FREEANGIN sprej se používá ke zmírnění podrážděné sliznice ústní dutiny a hltanu po chirurgických zákrocích nebo zánětech spojených s nachlazením nebo bolestí v krku jako je škrábání/pálení, suchost sliznice, podráždění hlasivek a chrapot. Napomáhá k udržení vlhkosti a elasticity sliznice a zmírňuje nepříjemný pocit bolesti v krku.

Způsob užívání: Před použitím protřepejte lahvičku s otočným aplikátorem. Otočte aplikátor o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Vystříkejte ústní dutinu a hrdlo stlačením otočného aplikátoru dvakrát až třikrát.

Pokyny k používání: FREEANGIN sprej je určený pro děti od 2 let. Děti do 6 let musí užívat přípravek pod dohledem dospělých. Užívejte 3x denně 2-3 vstříky do krku až do odeznění onemocnění. Po aplikaci se doporučuje nejíst a nepít minimálně 30 minut.

Sprej je určen pro použití jedním uživatelem. Pokud příznaky onemocnění neustoupí po týdnu užívání, vyhledejte pomoc u lékaře.

Upozornění: Nepoužívejte, pokud jste alergičtí nebo přecitlivělí na některou složku tohoto výrobku. Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchněte oči proudem čisté vody. Při rozsáhlejší postihnutí je nutné vyhledat lékaře. Nejsou

k dispozici žádné poznatky, které by bránily užívání přípravku během těhotenství a kojení.

Doba použitelnosti: Při dodržení stanovených podmínek skladování je doba použitelnosti neotevřeného balení 36 měsíců od data výroby. Po otevření balení spotřebujte do 3 měsíců.

Nežádoucí účinky: Nebyly zjištěny.

Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem, nahláste výrobci (viz kontakt níže), popř. na příslušný orgán členského státu. („závažnou nežádoucí příhodou“ se rozumí událost, která přímo nebo nepřímo vede, mohla vést nebo může vést k některému z těchto následků: a) smrt pacienta, uživatele nebo jiné osoby, b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele či jiné osoby, c) závažné ohrožení veřejného zdraví).

Likvidace: Ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Provedení: lahvička s rozprašovačem

Obsah balení: 25 ml

Výrobce:

TEREZIA COMPANY

Družstevná 13, 946 51 Nesvady, SR

Tel: +421 (0) 35 769 25 30

E-mail: info@terezia.eu www.terezia.sk


Distributor:

TEREZIA COMPANY


Na Návrší 997/14, 141 00 Praha 4, ČR

Tel.: +420 261 221 277


E-mail: info@terezia.eu www.terezia.eu



1. Před použitím lahvičku protřepejte.



2. Uchopte lahvičku tak, aby aplikátor směřoval k vám.



3. Otočte aplikátor o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.



4. Vystříkejte ústní dutinu a hrdlo stlačením otočného aplikátoru dvakrát až třikrát.

 - prečítať návod na použitie  - číslo šarže  - použiteľné do  - zdravotnícka pomôcka
 - skladovanie - obmedzenie teploty  - nevystavujte slnečnému žiareniu

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie o výrobcovi a výrobku. Túto zdravotnícku pomôcku používajte tak, ako je to opísané v tomto návode na použitie.

FREEANGIN sprej s rakytníkovým olejom a prírodným extraktom z bylín (ďalej len FREEANGIN sprej).

ANGIN

Zloženie: Rastlinný olej, rakytníkový olej (*Hippophae rhamnoides oil*), extrakt z listov šalvie lekárskej (*Salvia officinalis*), extrakt z kvetov nechtíka lekárskeho (*Calendula officinalis*), extrakt z harmančeka pravého (*Chamomilla recutita*), extrakt z listov mäty piepornej (*Mentha piperita*).

Mechanizmus účinku: FREEANGIN sprej vytvára na povrchu sliznice ústnej dutiny a hltanu olejovitý ochranný film, ktorý bráni prenikaniu mikroorganizmov do ľudského organizmu.

Podmienky skladovania: Skladujte na suchých miestach, ktoré sú chránené pred priamym pôsobením slnečných lúčov pri teplote od 15 °C do 25 °C.

Určený účel použitia: FREEANGIN sprej sa používa na zmiernenie podráždenej sliznice ústnej dutiny a hltanu po chirurgických zákrokoch alebo zápaloch spojených s prechladnutím alebo bolesťou v hrdle ako je skriabanie/pálenie, suchosť sliznice, podráždenie hlasiviek a zachrípnutie. Napomáha k udržaniu vlhkosti a elasticity sliznice a zmierňuje nepríjemný pocit bolesti v krku.

Pokyny o zaobchádzaní: Pred použitím pretrepte liekovku s otočným aplikátorom. Otočte aplikátor o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. Vystriekajte ústnu dutinu a hrdlo stlačením otočného aplikátora dvakrát až trikrát.

Pokyny o používaní: FREEANGIN sprej je určený pre deti od 2 rokov. Deti do 6 rokov musia užívať prípravok pod dohľadom dospelého. Užívajte 3x denne 2-3 vstreky do hrdla až do odznenia ochorenia. Po aplikácii sa odporúča nejest' a nepiť minimálne 30 minút. Sprej je určený na použitie jedným užívateľom. Ak príznaky ochorenia neustúpia po týždni užívania, je potrebné vyhľadať lekára.

Upozornenie na opatnosť: Nepoužívajte, pokiaľ ste alergický alebo precitlivý na niektorú zložku tohto výrobku. V prípade zasiahnutia očí ich rýchlo a dôkladne vypláchnite prúdom čistej vody. Pri rozsiahlejšom postihnutí je nutné vyhľadať lekára. Nie sú k dispozícii žiadne poznatky, ktoré by bránili užívaniu prípravku počas tehotenstva a dojčenia.

Doba použiteľnosti: Pri dodržaní stanovených podmienok skladovania je doba použiteľnosti neotvoreného balenia 36 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení balenia je doba použiteľnosti 3 mesiace.

Nežiaduce účinky: Neboli zistené.

Akúkoľvek závažnú nežiaducu príhodu, ku ktorej prišlo v súvislosti s touto zdravotníckou pomôckou, nahláste výrobcovi (pozri kontakt nižšie), príp. na príslušný orgán členského štátu. („Závažnou nežiaducou príhodou“ sa rozumie udalosť, ktorá priamo alebo nepriamo vedie, mohla viesť alebo môže viesť k niektorému z týchto následkov: a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby, b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa či inej osoby, c) závažné ohrozenie verejného zdravia).

Zneškodňovanie: V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 79/2015 Z. z., O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhotovenie: liekovka s rozprašovačom
Obsah balenia: 25 ml

Výrobca:

TEREZIA COMPANY

Družstevná 13, 946 51 Nesvady, SR
 Tel: +421 (0) 35 769 25 30


E-mail: info@terezia.eu www.terezia.sk

Distribútor:


TEREZIA COMPANY

Na Návrší 997/14, 141 00 Praha 4, ČR
 Tel.: +420 261 221 277


E-mail: info@terezia.eu www.terezia.eu



1. Pred použitím liekovku pretrepte.



2. Uchopte liekovku tak, aby aplikátor smeroval k vám.



3. Otočte aplikátor o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.



4. Vystriekajte ústnu dutinu a hrdlo stlačením otočného aplikátora dvakrát až trikrát.