



ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ € 0482

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Medistus® Antivirus lágypasztilla Kistosyn® 200-kivonattal.

Vírusos és bakteriális eredetű, fertőző és gyulladásos légúti megbetegedések megelőzésére – fizikai (mechanikai) akadályképzéssel a száj- és garatnyálkahártyán.

Felnőttek és tizenévesek, illetve 6 éves és idősebb gyermekek részére.

Tisztelt Felhasználó!

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz, amelyeket a termék használatakor szem előtt kell tartania. Kérdés esetén, kérjük, forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészeéhez.

Mit tartalmaz a Medistus® Antivirus lágypasztilla?

Egy lágypasztilla 840 mg Kistosyn® 200-kivonatot tartalmaz (melynek összetevői: gumiarábikum, mediterránbodorrozs [Cistus creticus]-kivonat, illatosrutalevél [Agathosma betulina]-kivonat, kínaiszederlevél [Rubus chingii var. suavisissimus]-kivonat).

Egyéb összetevők: maltodextrin, maltit, szorbit, aszkorbinsav, citromsav, sárgabarack-aroma, feteribiszke-aroma, közepes láncú trigliceridek, szteviakivonat, borsmentaolaj, tisztított víz.

Mikor használja a Medistus® Antivirus lágypasztillát?

A lágypasztillák használata vírusos és bakteriális eredetű, fertőző és gyulladásos légúti megbetegedések megelőzésére ajánlott – fizikai (mechanikai) akadályképzéssel a száj- és garatnyálkahártyán.

A Medistus® Antivirus lágypasztillában jelen levő Kistosyn® 200-kivonat természetes hatóanyagai filmszerű védőréteget képeznek a száj- és a garatnyálkahártyán. Ez a védőréteg olyan fizikai (mechanikai) akadályt jelent a légúti fertőzést okozó vírusok és baktériumok számára, amely segít megelőzni a szervezet sejtjeibe történő behatolásukat és további szaporodásukat.

Mely esetekben szükséges körültekintően eljárni a Medistus® Antivirus lágypasztilla használata során?

Ne használja a Medistus® Antivirus lágypasztillát, ha allergiás (túlérzékeny) a mediterrán bodorrozsra, az illatos ruta levelére, a kínai szeder levelére, a gumiarábikumra, a borsmentaaromára, vagy a jelen orvostechikai eszköz bármely más összetevőjére.

A lágypasztillák használata gyermekek esetén kizárólag 6 éves kortól javasolt.

A lágypasztillák gyermekek számára fulladásveszélyt jelenthetnek, ha a gyermek még nem képes a lágypasztillát biztonságosan elszopogatni. Gyermekek esetében különös gondossággal kell eljárni.

A Medistus® Antivirus lágypasztilla egyenként 0,5 g maltitot és 0,4 g szorbitot tartalmaz. Ha kezelőorvosa arról tájékoztatta Önt, hogy bizonyos cukrokkal szemben intolerancia áll fenn Önénél (a termék cukoralkoholokat tartalmaz), az orvostechikai eszköz használata előtt forduljon kezelőorvosához.

A szorbit gyomor- és bélrendszeri diszkomfortérzést okozhat, és enyhén hashajtó hatású lehet.

A Medistus® Antivirus lágypasztilla mentolt és cineolt tartalmaz az illatosrutalevél-kivonat összetevőjeként.



ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ €0482

Használható a Medistus® Antivirus lágypasztilla terhesség és szoptatás alatt?

Megfelelő adatok hiányában a termék használata terhesség és szoptatás alatt nem ajánlott.

Hogyan használja a Medistus® Antivirus lágypasztillát?

Adagolás:

Felnőttek számára egy lágypasztilla lassú elszopogatása javasolt, napi 3-6 alkalommal. 12 év feletti (és legalább 25 kg testsúllyal rendelkező) gyermekek számára egy lágypasztilla lassú elszopogatása javasolt, napi 3 alkalommal. 6 év feletti gyermekeknek napi egy lágypasztilla lassú elszopogatása javasolt.

Kölcsönhatások más orvostechnikai eszközökkel és egyéb interakciók

A gyógyszerkölsönhatások elkerülése érdekében hagyjon 2 óra szünetet a bevételek között, vagy forduljon orvoshoz.

Lehetséges mellékhatások

Nincs ismert mellékhatás.

Túladagolás

A Medistus® Antivirus lágypasztilla túladagolása a lágypasztilla cukorhelyettesítő (szorbit és maltit) összetevői miatt hashajtó hatású lehet.

Amennyiben a Medistus® Antivirus lágypasztilla használatának megkezdését követő 2-3 napon belül nem tapasztal javulást, vagy a tünetek jelentősen rosszabbodnak (pl. láz esetén), forduljon orvoshoz.

A tárolásra és az eltarthatóságra vonatkozóan milyen utasításokat kell figyelembe venni?

A lejárat dátum a kartondobozon és a bliszteren van feltüntetve. Ne használja a csomag tartalmát a dátum után.



Száraz helyen tárolandó. Ne tárolja 25°C feletti hőmérsékleten!

A Medistus® Antivirus lágypasztilla a normál háztartási hulladékba helyezhető.

Milyen kiszerelésben kapható a Medistus® Antivirus lágypasztilla?

Dobozonként 10 db lágypasztilla.



Gyártó

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck
Németország

Jogtulajdonos:

Innopharm GmbH
Hauptplatz 1
A-7350 Oberpullendorf
Ausztria

Forgalmazó:

VitaPlus Kft.
H-1138 Budapest
Dunavirág u. 2-6., 1. torony 5. em.

www.medistus.com

Gyermekek elől elzárva tartandó.