



Medistus® Anti Allergy – ORRSRAY

A **Medistus® Anti Allergy** biztonságosan és hatásosan véd az allergiás nátha tüneteivel szemben. A **Medistus® Anti Allergy** összetevői révén védőréteget képez az ornyálkahártyán, így a nyálkahártya nem kerül érintkezésbe az allergénnel (pollenek, atkák, állati szőrök), amelyek kiváltják az ornyálkahártya-gyulladás tüneteit (viszketés, orrfolyás, tüsszögés...). Az aloénak és az illóolajoknak köszönhetően a nyálkahártya friss és hidratált marad. A hatásosabb kezelés érdekében érdemes a **Medistus® Anti Allergy** készítményt megelőző jelleggel, vagy az első tünetek megjelenésekor alkalmazni.

Összetétel:

Tisztított víz, glicerin, nátrium-klorid (2,2%), dikálium-hidrogén-foszfát, etoxilált hidrogénezett ricinusolaj, aloe vera, kálium-dihidrogén-foszfát, xantángumi (0,3%), C-vitamin (aszorbinsav), EDTA-dinátriumsó-dihidrát, benzalkónium-klorid, citrom illóolaj, eukaliptusz illóolaj, niaouli illóolaj, borsmenta illóolaj és nátrium-hidroxid.

Használati útmutató:

- Használat előtt rázza fel a flakont, és távolítsa el a védőkupakot. Az első használatkor előfordulhat, hogy többször meg kell nyomni az adagolófejet a permet befújásához.
- Vezesse be finoman az orrspray adagolófejét az egyik orrlyukba, és nyomja meg a pumpát az orrspray bejuttatásához.
- Ismételje meg az eljárást a másik orrlyuknál.
- Tisztítsa meg az adagolófej végét vízzel, és törölje szárazra.
- Tegye rá az orrspray adagolófejére a védőkupakot a legközelebbi használatig.

A védőréteg kialakulása miatt enyhe orrdugulást érezhet használat közben, amely néhány perc múlva megszűnik.

Amennyiben a használat során panaszai támadnak, hagyja abba a kezelést, és forduljon orvoshoz.

Ajánlott adag:

Felnőtteknek és gyermekeknek 6 éves kortól: 1 befújás mindkét orrlyukba, legfeljebb 3-szor naponta.

Ellenjavallatok és mellékhatások:

- Az ajánlott terápiás adagok betartása mellett nincs ismert mellékhatás, de ha mellékhatásokat tapasztal, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.
- A termékkel kapcsolatos minden súlyos mellékhatást jelenteni kell a gyártónak, a forgalmazónak és az Ön országában illetékes nemzeti egészségügyi hatóságnak.

**Figyelmeztetések és óvintézkedések:**

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Amennyiben ismert vagy feltételezett allergia áll fenn a jelen orvostechikai eszköz bármelyik összetevőjével szemben, elővigyázatosságból célszerű kerülni a használatát.
- A termék használata terhesség és szoptatás alatt nem ajánlott.
- Limonént és citrált tartalmaz, amelyek természetesen jelen vannak az illóolajokban.
- Higiéniai okokból és a kórokozók terjedésének megakadályozása érdekében ezt a flakont csak egy személy használhatja.

Eltarthatósági és lejárati idő:

- Ne használja a dobozra és a flakonra nyomtatott lejárati idő után.
- Az első felbontástól számított 3 hónap múlva ki kell dobni.
- Hűvös és száraz helyen tárolandó. 40 °C alatt tárolandó.
- Ártalmatlanítás céljából a flakont és a védőkupakot helyezze a megfelelő gyűjtőedényekbe.

Kiszerelés:

Spray hajtógáz nélkül, 20 ml-es flakonban, orrspray-adagolófejjel.



Gyártó: PHARMALINK, S.L.

Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
BARCELONA - SPAIN

Forgalmazó: VitaPLus Kft. 

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 1. torony, 5. emelet

 Infovonal: +36 1 239 0432

 Web: www.medistus.com

 E-mail: vitaplus@vitaplus.hu



0051



PL0075

A legutóbbi felülvizsgálat időpontja: 2023.03.28.

A termékkel kapcsolatos tapasztalatainak megismerése hozzásegít bennünket a további fejlődéshez.

MAAHU301_I1