


Co jest przyczyną nadwrażliwości zębów?

Nadwrażliwość zębów, znana również jako hipernadwrażliwość zębiny, jest powszechną dolegliwością, która powstaje kiedy zębina jest odsłonięta. Cofanie się dziąseł i uszkodzone szkliwo mogą spowodować odsłonięcie tysięcy mikroskopijnych kanalików w szyjce zębowej, które prowadzą do ośrodka nerwowego zęba. Wszelkie bodźce spowodowane kontaktem zębów z gorącymi, zimnym lub słodkimi posiłkami lub napojami są przewodzone przez kanaliki zębinowe do nerwów, co wywołuje ból i dyskomfort.



Nadwrażliwość zębów może być spowodowana wieloma czynnikami, a główne z nich to:

- Recesja dziąseł: powstaje, gdy dziąsła cofają się odsłaniając zębinę. Choroby dziąseł są dominującą przyczyną recesji dziąseł
- Ścieranie szkliwa: powstaje, gdy szkliwo się niszczy podczas zbyt intensywnego szczotkowania i/lub poprzez kwasy obecne w jedzeniu i napojach.

Wskazówki pielęgnacji nadwrażliwych zębów



Ogranicz spożywanie kwasów z jedzenia i picia



Sprawdź ze stomatologiem, jak uniknąć zbyt intensywnego czyszczenia oraz używaj szczoteczki do zębów z miękkimi włoskami.



Poproś stomatologa o rekomendację pasty do zębów opracowanej, by przynosić ulgę w ból spowodowanym nadwrażliwością zębów, takiej jak elmex® Sensitive Professional.


elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT

pasta do zębów zapewniająca natychmiastowe¹ i długotrwałe² zniesienie bólu spowodowanego nadwrażliwością zębiny



TECHNOLOGIA PRO-ARGIN

CYNK




Technologia Pro-Argin pomaga chronić wrażliwe obszary zębów

Cynk pomaga **wzmacniać dziąsła i chronić przed recesją dziąseł** - główną przyczyną nadwrażliwości²

Natychmiastowa¹ i długotrwała ulga w nadwrażliwości zębów²

- natychmiastowa ulga z **60.5% zmniejszeniem** bólu spowodowanego nadwrażliwością **od pierwszego użycia**¹
- Długotrwała ulga z **80.5% zmniejszeniem** nadwrażliwości **po 8 tygodniach**²

Ponad **25% redukcji** problemów z dziąsłami **po 6 miesiącach**²



*w porównaniu ze zwykłą pastą z fluorem 1450ppmF-.

¹Dla uzyskania natychmiastowej ulgi w bólu pastę nakładać opuszką palca na nadwrażliwą powierzchnię zęba i delikatnie masować przez minutę.

²Przy regularnym stosowaniu