

# Saltadol®

Glucose-Elektrolyt-Mischung

Zur diätetischen Behandlung von Flüssigkeitsmangel (Dehydrierung) bei Durchfallerkrankungen.

Saltadol® ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät). Es ist so zusammengesetzt, dass der Elektrolyt- und Wasserhaushalt risikolos ausgeglichen werden kann. Das Mengenverhältnis der Bestandteile von Saltadol® ist genau abgestimmt, wurde angepasst und entspricht in reduzierter Osmolarität der WHO-Formulierung für die Zuführung verlorengegangener Elektrolyte.

Nährwertdeklaration	pro 100 g	Pro Einzeldosis (200 ml)
Brennwert	1111 kJ/261,5 kcal	45,9 kJ/10,8 kcal
Fett	0 g	0 g
-gesättigte Fettsäuren	0 g	0 g
Kohlenhydrate	65,38 g (5,3 BE)	2,7 g (0,22 BE)
- Zucker	65,38 g (5,3 BE)	2,7 g (0,22 BE)
Eiweiß	0 g	0 g
Salz	12,6 g	0,52 g
	pro 100 g	Pro Einzeldosis (200 ml)
Natrium	7748 mg	320 mg
Kalium	3874 mg	160 mg
Chlorid	11138 mg	460 mg

## Elektrolytgehalt der fertigen Lösung:

Na+ 75 mmol/l

K+ 20 mmol/l

Cl- 65 mmol/l

Citrat 10 mmol/l

D-Glucose 75 mmol/l

Osmolarität nach Zubereitung: ca. 245mmol/l

Der Mineralstoffgehalt wurde der erforderlichen Osmolarität angepasst.

## Zutaten:

Traubenzucker, Kochsalz, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Süßungsmittel Acesulfam K und Aspartam.

## **Vorsichtsmaßnahmen/Wechselwirkungen:**

Patienten mit Herzschwäche und erhöhtem Blutdruck sollten vor Beginn der diätetischen Behandlung den behandelnden Arzt befragen. Patienten, die eine gleichzeitige Therapie mit herzwirksamen Glukosiden erhalten, sind sorgfältig in ihrem Kaliumgehalt zu überwachen. Vermeiden Sie zuckerhaltige Getränke, wie Limonaden, Cola-Getränke usw. Der erhöhte Zuckergehalt fördert und verlängert den Durchfall.

## **Wichtige Hinweise:**

Geeignet für Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder und Erwachsene.

Nicht zur Selbstbehandlung schwerer Durchfälle verwenden, die länger als 3 Tage andauern. Diabetikern soll Saltadol® nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gegeben werden. Nicht anwenden bei Ausscheidungsstörungen der Nieren, metabolischer Alkalose, unstillbarem Erbrechen, Kohlenhydrataufnahmestörungen, Bewusstseinstrübungen und Schock. Nicht anwenden bei akutem Flüssigkeitsmangel infolge von Verschlusserkrankungen im Verdauungstrakt. **Saltadol® bitte nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.**

## **Hinweise zur Anwendung:**

Ein Beutel enthält 4,13 g Pulvermischung.

Der Inhalt eines Beutels wird in 200 ml abgekochtem, abgekühltem Wasser oder Tee aufgelöst und warm oder kalt getrunken.

Die individuelle Dauer der Anwendung richtet sich nach der Anweisung des Arztes. Sie dauert bei Säuglingen und Kleinkindern in der Regel 6 – 12 Stunden, maximal 24 Stunden.

### **Säuglinge:**

bei Weglassen jeder Nahrung über 24 Stunden verteilt eine Trinkmenge von 120 – 150 ml pro kg/Körpergewicht. Pro Stunde sollte die Trinkmenge ca. 10 ml/kg Körpergewicht betragen. Die Tagesmenge sollte bei Säuglingen auf 6 Beutel begrenzt werden.

### **Kleinkinder, Schulkinder und Erwachsene:**

Trinken, je nach Bedarf, mehrmals täglich den Inhalt des Beutels, gelöst in 200 ml Flüssigkeit. Erwachsene können bei starkem Durchfall bis zu 4 Liter Saltadol® über den Tag verteilt trinken. Dies entspricht einer Menge von 20 Beuteln.

Saltadol® ist geschmacksneutral, glutenfrei und lactosefrei.

## **Packungsgrößen:**

Saltadol® ist nur in Apotheken erhältlich in Packungen zu 6 Beuteln und 12 Beuteln.

## **Vertrieb und wissenschaftliche Information:**

Aristo Pharma GmbH  
Wallenroder Straße 8 – 10,  
13435 Berlin  
Tel: (030) 71094-4200  
Fax: (030) 71094-4250  
[www.aristo-pharma.de](http://www.aristo-pharma.de)

Hergestellt in Deutschland.