

Lieber Gluco-test Plus Anwender:

Vielen Dank für Ihre Wahl unseres Gluco-test Plus Blutzuckermesssystems. Mit dem Gluco-test Plus haben Sie sich für ein benutzerfreundliches Blutzuckermesssystem entschieden, welches Ihnen auch die Möglichkeit bietet, Blutproben von alternativen Körperstellen (AST) zu gewinnen. Besondere Vorteile bietet auch die Teststreifen-Auswurf-Funktion sowie die Erinnerungsfunktion zum Einstellen definierter Messzeiten. Diese Kurzinformation soll Ihnen helfen, schnell mit Ihrem neuen Gluco-test Plus vertraut zu werden.

Bestandteile zur Blutzuckermessung



TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Road,
Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)
www.taidoc.com



MedNet GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Deutschland



Vertrieb: Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10
13435 Berlin, Deutschland



0123

Gluco-test TD-4230

STARTERSET ZUR BLUTZUCKERMESSUNG

In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung



Schnellanleitung

1. Messung des Blutzuckers



- 1-1 Waschen Sie sich Ihre Hände gründlich und trocknen Sie diese sorgfältig ab. Entnehmen Sie einen Teststreifen aus der Teststreifendose und verschließen Sie diese dann fest.



- 1-2 Führen Sie den Teststreifen in das Gerät ein. Das Gerät ist eingeschaltet. Folgender Dialog erscheint blinkend im Display: CHK und  Umgebungs-temperatur  „“ und die Codenummer.



- 1-3 Stellen Sie sicher, dass die Codenummer im Display mit der Codenummer auf der Teststreifendose übereinstimmt.



- 1-4 Wenn  in der Anzeige blinkt, lassen Sie bitte Ihr Blut an der Aufnahmeöffnung des Teststreifens einsaugen, bis die Messung selbstständig beginnt.



- 1-5 Das Ergebnis Ihrer Blutzuckermessung wird angezeigt, nachdem das Messgerät bis auf 0 zurückgezählt hat. Der Messwert wird automatisch im Messgerät gespeichert.



- 1-6 Entfernen Sie den Teststreifen durch Betätigen des seitlichen Streifenauswurfschiebers oder direkt durch Ziehen mit der Hand. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ab. Bitte entsorgen Sie Lanzetten und Teststreifen gemäß den geltenden Vorschriften.

2. Anzeigen des Ergebnisses

Ihr Ergebnis wird folgendermaßen angezeigt.
 /  /  /  /  / 

		
erscheint, wenn Ihr Ergebnis unterhalb der Messgrenze von < 20 mg/dL (1.1mmol/L) liegt	erscheint, wenn Ihr Ergebnis zwischen 20-69 mg/dL (1.1-3.8 mmol/L) liegt	erscheint, wenn Ihr Ergebnis im Normbereich 70-119 mg/dL (3.9-6.6 mmol/L) liegt
		
erscheint, wenn Ihr Ergebnis bei 120 mg/dL und mehr (6.6 mmol/L) liegt	erscheint zusammen mit  wenn der Wert 240 mg/dL (13.3 mmol/L) und mehr beträgt	wird angezeigt, wenn Ihr Ergebnis einen Wert von > 600 mg/dL (33.3mmol/L) übersteigt

Warnung:

““ oder ““ Symbol zeigt Hypoglykämie (niedriger Blutzucker) an. Sie sollten unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

““, ““ oder ““ Symbol zeigt Hyperglykämie (hoher Blutzucker) an. Sie sollten unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.