

IMPORTANT POINTS TO KNOW BEFORE USING A CONDOM 1. If extra lubrication is needed, use water-based lubricants. 2. DO NOT USE OIL BASED LUBRICANTS such as petroleum jelly, mineral oil and cold cream, as they may weaken the condom and cause subsequent failure of the product. So use topical medicines that are applied to the penis or vagina. If you are not sure about the effect of the medicines you're using on condoms, ask your doctor or pharmacist. 3. Do not use the condom if the rubber material is sticky or brittle or the individual component is obviously damaged. 4. Seek medical assistance as soon as possible, at the earliest warning of a condom leak or if you feel a condom has slipped off. 5. Do not use a condom if you have experienced a condom leak, a breakage and infection. 6. When used correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the risk of transmitting HIV/AIDS and other sexually transmitted infections. 7. No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV and STIs. If you suspect that you or your partner may have become pregnant or have been exposed to HIV or other sexually transmitted infections, you should seek medical advice as early as possible. 8. If you are allergic to natural rubber latex products, consult your doctor for advice before use. 9. Store in a cool dry place away from direct sunlight. 10. Keep away from car, can choke or suffocate on uninflated or broken condom fragments. 11. Use of condom during oral sex increase the risk of asphyxiation or choking. 12. The use of additional lubricants during and sex can reduce the risk of breakage. 13. Condom is a medical device to be used by its persons. 14. Any sexual intercourse should be preceded by a thorough medical examination of the condom by the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. 15. These condoms conform to International standards ISO 4074/EN ISO 4074.

WICHTIGE HINWEISE, BEVOR SIE EIN KONDOM VERWENDEN 1. Wenn Sie zusätzliche Gleitmittel benötigen, verwenden Sie wasserbasierte Gleitmittel. 2. NICHT OIL-BASIERTE GLEITMITTEL wie Vaseline, Mineralöl und Cold-Cream, da diese das Kondom schwächen und zu einem späteren Versagen des Produkts führen können. Sie gilt auch für einige topische Medikamente, die auf den Penis oder die Vagina angewendet werden. Wenn Sie sich über die Wirkung der Arzneimittel, die Sie in Verbindung mit Kondomen anwenden, unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 3. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn das Gummimaterial klebrig oder spröde ist oder die einzelne Verpackung offensichtlich beschädigt ist. 4. Suchen Sie so bald wie möglich einen Arzt auf, wenn Sie vermuten, dass Sie oder Ihr Partner schwanger sein könnten oder sich HIV oder anderen sexuell übertragbaren Infektionen ausgesetzt haben. 5. Wenn Sie allergisch gegen Naturkautschukprodukte sind, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Kondome verwenden. 6. Wenn Sie ein Kondom mit einem Leck oder einer Ruptur bemerken, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. 7. Wenn Sie eine Schwangerschaft vermuten oder sich HIV oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten ausgesetzt haben, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt. 8. Dieses Produkt enthält Latex, das allergische Reaktionen einschließlich einem anaphylaktischen Schock hervorrufen kann. Wenn Sie allergisch gegen Naturkautschukprodukte sind, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt. 9. An einen Kaugummi, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. 10. Von Kindern fernhalten. Es kann verschluckt werden und zu Erstickungsgefahr führen. 11. Verwenden Sie das Kondom nicht während der Einnahme von oralen Kontrazeptiva. 12. Die Verwendung zusätzlicher Gleitmittel beim Anverkehr kann das Risiko von Beschädigungen verringern. 13. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für Latex - erwachsene Männer oder Frauen. 14. Jeder Schweregraden Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist. 15. Diese Kondome entsprechen den internationalen Normen ISO 4074/EN ISO 4074.

SAVOIR AVANT D'UTILISER UN PRÉSÉRVATIF 1. Si une lubrification supplémentaire est nécessaire, utilisez des lubrifiants à base d'eau. 2. N'UTILISEZ PAS DE LUBRIFIANTS À BASE D'HUILE : vaseline, huile minérale et cold cream, car ils peuvent fragiliser le préservatif et lui faire perdre son efficacité. Il en est de même de certains médicaments topiques appliqués sur le pénis ou du vagin. Si vous n'êtes pas sûr des effets des médicaments que vous utilisez sur les préservatifs, demandez à votre docteur ou à votre pharmacien. 3. N'utilisez pas le préservatif si le latex est collant ou cassant, ou si la pochette est visiblement endommagée. 4. Consultez un médecin dès que vous pensez qu'il y a eu une grossesse ou que vous pensez que vous ou votre partenaire avez pu être exposés à l'infection par le VIH ou à d'autres infections sexuellement transmissibles. 5. Si vous êtes allergique au caoutchouc naturel, consultez votre médecin avant d'utiliser pour la première fois un préservatif. 6. Si vous avez constaté une fuite ou une déchirure, consultez immédiatement un médecin. 7. Si vous suspectez une grossesse, consultez un médecin. 8. Si vous suspectez une grossesse, consultez un médecin. 9. Si vous suspectez une grossesse, consultez un médecin. 10. Si vous suspectez une grossesse, consultez un médecin. 11. Si vous suspectez une grossesse, consultez un médecin. 12. Si vous suspectez une grossesse, consultez un médecin. 13. Si vous suspectez une grossesse, consultez un médecin. 14. Si vous suspectez une grossesse, consultez un médecin. 15. Si vous suspectez une grossesse, consultez un médecin.

COSAS IMPORTANTES A SABER ANTES DE UTILIZAR UN PRESERVATIVO 1. Si necesita lubricación adicional, utilice lubricantes con base de agua. 2. NO UTILICE LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE: vaselina, aceite mineral y crema fría, ya que pueden debilitar el condón y hacer perder su eficacia. Si necesita utilizar algunos medicamentos tópicos que se aplican en el pene y la vagina, si no está seguro del efecto de los medicamentos que está utilizando en los preservativos, consulte con su médico o farmacéutico. 3. No use el preservativo si el material de goma está pegajoso o quebradizo, o si el envase individual está claramente dañado. 4. Si el preservativo tiene fugas o se rompe durante su utilización, busque asistencia médica lo antes posible, en un plazo máximo de 72 horas. 5. Si sospecha que usted o su pareja han podido estar expuestos a la infección por el VIH u otras infecciones de transmisión sexual, consulte a un médico. 6. Si los utilizas correctamente cada vez que tengas sexo, los preservativos de látex ayudan a prevenir el embarazo, y reducen el riesgo de transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 7. Ningún método anticonceptivo puede ofrecer un 100% de protección contra el embarazo, el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual. Si sospechas que puedes estar embarazada o si sospechas que tu pareja puede haber estado expuesta a la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, consulta a un médico. 8. Si sospechas que puedes estar embarazada o si sospechas que tu pareja puede haber estado expuesta a la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, consulta a un médico. 9. Si sospechas que puedes estar embarazada o si sospechas que tu pareja puede haber estado expuesta a la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, consulta a un médico. 10. Si sospechas que puedes estar embarazada o si sospechas que tu pareja puede haber estado expuesta a la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, consulta a un médico. 11. Si sospechas que puedes estar embarazada o si sospechas que tu pareja puede haber estado expuesta a la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, consulta a un médico. 12. Si sospechas que puedes estar embarazada o si sospechas que tu pareja puede haber estado expuesta a la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, consulta a un médico. 13. Si sospechas que puedes estar embarazada o si sospechas que tu pareja puede haber estado expuesta a la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, consulta a un médico. 14. Si sospechas que puedes estar embarazada o si sospechas que tu pareja puede haber estado expuesta a la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, consulta a un médico. 15. Si sospechas que puedes estar embarazada o si sospechas que tu pareja puede haber estado expuesta a la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, consulta a un médico.

PUNTI IMPORTANTI DA CONOSCERE PRIMA DI UTILIZZARE UN PRESERVATIVO 1. Nel caso in cui fosse necessaria una lubrificazione aggiuntiva, utilizzare lubrificanti a base d'acqua. 2. NON UTILIZZARE LUBRIFICANTI A BASE DI OLIO quali vasellina, olio minerale e crema fredda, in quanto potrebbero indebolire il preservativo e causare un successivo cedimento del prodotto. Se si deve utilizzare alcuni prodotti farmacia che si applicano sul pene o sulla vagina, se non si è sicuri dell'effetto di questi prodotti sui preservativi, rivolgersi al medico o al farmacista. 3. Non usare il preservativo se il materiale in gomma è appiccicoso o fragile o il singolo contenitore presenta danni. 4. Richiedere assistenza medica il prima possibile, almeno entro 72 ore in caso di perdita o esplosione del preservativo durante l'uso. 5. Preservativi sono esclusivamente monouso, i preservativi riutilizzati potrebbero aumentare il rischio di rottura e infezione. 6. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico. 7. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico. 8. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico. 9. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico. 10. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico. 11. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico. 12. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico. 13. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico. 14. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico. 15. Se si sospetta che si sia esposti a una infezione, si consiglia di consultare un medico.

BEWAARLIJKE PUNTEN DIE U MOET WETEN VOORDAT U EEN CONDOM GEBRUIKT 1. Als extra smering nodig is, gebruik dan op water gebaseerde glijmiddelen. 2. GEBRUIK GEEN OP OLIE GEBASEERDE SMERMGIDDELEN, zoals vaseline, minerale olie en koude zalf, die het condoom kunnen verzwakken en er vervolgens kunnen voor zorgen dat het product faalt. Dat geldt ook voor sommige topische medicijnen die op de penis of vagina worden aangebracht. Als u niet zeker weet wat het effect is van de medicijnen die u gebruikt op condooms, vraag dan aan uw arts of apotheker. 3. Gebruik het condoom niet als het rubberen materiaal plakkerig of bros is of de individuele verpakking duidelijk beschadigd is. 4. Zoek zo snel mogelijk medische hulp als u een lekkage of een scheur van de 72 uur als een condom tijdens gebruik lekt of barst. 5. Condooms zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik, een hergebruikt condom kan het risico op breuk en infectie vergroten. 6. Bij correct gebruik, elke keer dat u seks hebt, helpen latexcondoms zwangerschap te voorkomen, verminderen ze het risico op overdracht van hiv en andere seksueel overdraagbare infecties. 7. Geen enkel condoom kan 100% bescherming bieden tegen zwangerschap of overdracht van hiv en andere seksueel overdraagbare infecties. 8. Als u denkt dat u of uw partner mogelijk zwanger is geraakt of besmet is, 8. Dit product bevat natuurlijk rubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken, waaronder een anafylactische shock. Als u allergisch bent voor producten van natuurlijke rubberlatex, raadpleeg dan voor gebruik uw arts voor advies. 9. Bewaar de condooms op een koele, droge plaats, niet de buurt van direct zonlicht. 10. Houd ze uit de buurt van kinderen. Kan gevaar voor verstikking veroorzaken door niet opzettelijk of onopzettelijk te worden verslutteld. 11. Het gebruik van een condoom kan het risico op asfyxie of suffocatie, 12. Het gebruik van extra glijmiddelen tijdens seks kan de kans op scheuren van het condoom vergroten. 13. Een condom is een medisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt door leden - volwassen mannen of vrouwen. 14. Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet gemeld aan de fabrikant en de competente autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patient is gevestigd. 15. Deze condooms voldoen aan de internationale normen ISO 4074/EN ISO 4074.

PONTOS IMPORTANTES A TER EM CONTA ANTES DE USAR UM PRESERVATIVO 1. Se precisar de lubrificante mais a zona, use lubrificantes à base de água. 2. NÃO USE LUBRIFICANTES COM BASE DE ÓLEO: vaselina, óleo mineral e creme frio, pois podem enfraquecer o preservativo e causar uma subsequente falha do produto. Se precisar utilizar alguns medicamentos tópicos destinados a ser aplicados no pénis ou na vagina, se não tiver a certeza do efeito que os medicamentos que toma podem ter no uso de preservativos, pergunte ao seu(s) médico(s) ou farmacêutico(s). 3. Não use o preservativo caso esteja pegajoso ou frágil, ou se a embalagem individual estiver danificada. 4. Procure ser rápido antes da assistência médica dentro das 72 horas seguintes se um preservativo deramarrar ou ficar durante o uso. 5. Os preservativos são produtos de uso único. Reutilizá-los pode aumentar o risco de ruptura e infeção. 6. Se suspeitar que você ou seu parceiro possam ter estado expostos a uma infecção, consulte um médico. 7. Nenhum método contraceptivo pode oferecer uma proteção de 100% contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de infeções sexualmente transmissíveis. 8. Nenhum método contraceptivo pode oferecer uma proteção de 100% contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de infeções sexualmente transmissíveis. 9. Nenhum método contraceptivo pode oferecer uma proteção de 100% contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de infeções sexualmente transmissíveis. 10. Nenhum método contraceptivo pode oferecer uma proteção de 100% contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de infeções sexualmente transmissíveis. 11. Nenhum método contraceptivo pode oferecer uma proteção de 100% contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de infeções sexualmente transmissíveis. 12. Nenhum método contraceptivo pode oferecer uma proteção de 100% contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de infeções sexualmente transmissíveis. 13. Nenhum método contraceptivo pode oferecer uma proteção de 100% contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de infeções sexualmente transmissíveis. 14. Nenhum método contraceptivo pode oferecer uma proteção de 100% contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de infeções sexualmente transmissíveis. 15. Nenhum método contraceptivo pode oferecer uma proteção de 100% contra a gravidez ou a transmissão do VIH e de infeções sexualmente transmissíveis.

VIKTIG Å VETA FÖR DE BRUKER ET KONDOM 1. Hvis du trenger ekstra glide, bør du bruke vannbaserte glide midler. 2. BRUK IKKE OLJEBASERTE GLIDE MIDLER, slik som vaselin, mineralolje og kaldkrem, siden det kan svekke kondomet og gjøre at produktet ikke fungerer som det skal. Samme gjelder nemlig ikkeobehagelige reaksjoner som påføres penis eller vagina. Hvis du er usikker på hvilken effekt et legemiddel har på kondomet, bør du rådfore deg med lege eller farmasøyt. 3. Bruk ikke kondomet hvis gummi materialet er klebrig eller sprøtt, eller hvis beholderen det er i er tydeligvis skadet. 4. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 5. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller din partner har blitt gravid eller smittet, bør du søke medisinsk hjelp så snart som mulig, minst innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprækker under bruk. 9. Kondomer er kun ment til engangsbruk. Gjend brukte kondomer kan øke risikoen for brudd og infeksjon. 6. Hvis kondomene brukes riktig hver gang du har sex, vil de forhindre graviditet, redusere risikoen for HIV/AIDS-smitte og andre seksuelt overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100 % beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelt overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du

Импортёр | אדווייב | Người nhập khẩu

More languages:
mister-size.com/ifu