



Gebrauchsinformation: Information für Anwender

# anginetten®

HALSTABLETTEN **zuckerfrei  
mit Kirschgeschmack**

Cetylpyridiniumchlorid 1 H<sub>2</sub>O 0,33 mg  
Lutschtabletten

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack beachten?
3. Wie sind anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

## 1. WAS SIND ANGINETTEN® HALSTABLETTEN ZUCKERFREI MIT KIRSCHGESCHMACK UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Stoff- und Indikationsgruppe:  
Hals- und Rachen therapeutikum

Anwendungsgebiete:

anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack werden angewendet zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

## 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ANGINETTEN® HALSTABLETTEN ZUCKERFREI MIT KIRSCHGESCHMACK BEACHTEN?

### anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack dürfen NICHT eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Cetylpyridinium oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- von Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren,
- von Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen,
- bei offenen Wunden. Bei Schleimhautschäden sollte Cetylpyridinium wegen möglicher Wundheilungsstörungen nicht angewendet werden.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei bakteriellen Infekten kann eine gleichzeitige Therapie mit einem geeigneten Antibiotikum erforderlich sein.

Patienten mit Kontaktallergien sollten anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack nicht anwenden, da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Sensibilisierung besteht.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack ist erforderlich:

- Bei schweren Erkrankungen, die mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen einhergehen, soll ärztlicher Rat eingeholt werden.
- Sie sollen nur zur Behandlung akuter Beschwerden eingesetzt werden. Sie sind nicht zur Langzeitbehandlung geeignet.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack einnehmen.

### Einnahme von anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack mit anderen Arzneimitteln

anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack sollten nicht zeitnah mit dem Zähneputzen angewendet werden, da die Wirksamkeit durch die Inhaltsstoffe von Zahnputzmitteln beeinträchtigt werden kann.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack enthalten Isomalt, Levomenthol und Ponceau 4R (E 124)

Dieses Arzneimittel enthält Isomalt. Bitte nehmen Sie anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Lutschtablette enthält 2,6 g Isomalt. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Isomalt.





Isomalt kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Levomenthol Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

Ponceau 4R (E 124) kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 3. WIE SIND ANGINETTEN® HALSTABLETTEN ZUCKERFREI MIT KIRSCHGESCHMACK EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Lutschen Sie stündlich 1 Lutschtablette bzw. alle 2 Stunden 2 Lutschtabletten.

Kinder ab 6 Jahre lutschen alle 2 Stunden 1 Lutschtablette.

Sie sollten täglich nicht mehr als 12 Lutschtabletten einnehmen.

anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack sollen ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat nicht längerfristig eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack eingenommen haben, als Sie sollten**

Nach übermäßiger Anwendung einer großen Menge von anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack (deutlich mehr als 12 Lutschtabletten am Tag) kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen, Kreislaufkollaps und Koma sowie zu einer vermehrten Methämoglobinbildung (insbesondere bei Kindern) kommen. In diesen Fällen sollten resorptionsmindernde Maßnahmen (Verringerung der Aufnahme des Wirkstoffes) sowie ggf. Maßnahmen gegen Methämoglobinämie (insbesondere bei Kindern) eingeleitet werden.

Bei Verdacht auf eine Überdosierung mit anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Arzt. Dieser kann entsprechend der Schwere einer Überdosierung über die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen entscheiden.

#### **Wenn Sie die Einnahme von anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen (*kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen*):

- Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Schwellung der Haut/Schleimhäute, Nesselsucht, punktförmige Einblutungen der Haut in der Umgebung des Auges (periorbitale Purpura), Schwindel und Blutdruckabfall mit Atemnot)

- eine Verzögerung der Wundheilung

- bräunliche Verfärbungen des Zungenrückens und/oder der Zahnhäule

Nicht bekannt (*Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar*):

Eine Sensibilisierung ist möglich.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. WIE SIND ANGINETTEN® HALSTABLETTEN ZUCKERFREI MIT KIRSCHGESCHMACK AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister (Durchdrückpackung) angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 30°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arszneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arszneimittelentsorgung).

### 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

#### **Was anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack enthalten**

Der Wirkstoff ist: 1 Lutschtablette enthält 0,33 mg Cetylpyridiniumchlorid 1 H<sub>2</sub>O.

Die sonstigen Bestandteile sind: Isomalt (Ph.Eur.), Kirscharoma, Levomenthol, Ponceau 4R (E 124), Patentblau V (E 131) und Weinsäure (Ph.Eur.).

#### **Wie anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack aussehen und Inhalt der Packung**

anginetten® Halstabletten zuckerfrei mit Kirschgeschmack sind runde, rote, schwachtransparente Lutschtabletten und in Packungen mit 12, 24, 36 und 48 Lutschtabletten erhältlich.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer**

DIVAPHARMA GmbH  
Motzener Straße 41, D-12277 Berlin

#### **Hersteller**

Klosterfrau Berlin GmbH  
Motzener Straße 41, D-12277 Berlin

#### **Mitvertreiber**

M.C.M. Klosterfrau Vertriebs GmbH  
Gereonsmühlengasse 1–11, D-50670 Köln

#### **Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2025.**

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klosterfrau Kundenberatung:

Telefon: 0800 1652-100

Fax: 0800 1652-700

E-Mail: [dialog@klosterfrau-service.de](mailto:dialog@klosterfrau-service.de)

