

Medizinprodukt

Magen-Darm-Entspannung Intensiv

Darreichungsform: Kapsel

Wirksamer Bestandteil: Simeticon (250 mg)

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 15 Jahren. Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Magen-Darm-Entspannung Intensiv und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Magen-Darm-Entspannung Intensiv beachten?
3. Wie ist Magen-Darm-Entspannung Intensiv einzunehmen/anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Magen-Darm-Entspannung Intensiv aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

1. Was ist Magen-Darm-Entspannung Intensiv und wofür wird es angewendet?

- Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich
- Bei funktionellen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich wie Völlegefühl, vorzeitiges Sättigungsgefühl, Blähungen, Aufstoßen, Meteorismus (Darmkollern, Abgang von Darmgasen)

Verwendungszweck:

Bei Blähungen, Völlegefühl und Aufstoßen. Magen- und Darmmittel zur physikalischen Entschäumung.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Magen-Darm-Entspannung Intensiv beachten?

- Kontraindikationen:**
- Wechselwirkungen mit anderen Medizinprodukten oder Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Simeticon oder einen der sonstigen Bestandteile.
- Bei neu aufgetretenen und länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollte Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine u. U. zugrundeliegende behandlungsbedürftige Erkrankung diagnostiziert werden kann.
- In seltenen Fällen kann es durch die Inhaltsstoffe zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.
- Nicht nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums anwenden
- Für Kinder unter 15 Jahren nicht geeignet

3. Wie ist Magen-Darm-Entspannung Intensiv einzunehmen/anzuwenden?

Nehmen Sie dieses Medizinprodukt immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden: Erwachsene und Kinder ab 15 Jahren: 3–4 mal täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden. Falls erforderlich, kann das Produkt über längere Zeit eingenommen werden. Bei anhaltenden Störungen sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um eine Erkrankung handeln könnte, die der ärztlichen Abklärung bedarf.

Überdosierung (beabsichtigte oder versehentliche)

Vergiftungen durch das Produkt sind nicht bekannt. Der Wirkstoff Simeticon wird nicht in die Blutbahn aufgenommen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig eingenommen oder die Einnahme vergessen haben?

Nehmen Sie bei der nächsten Einnahme nicht die doppelte Menge ein, sondern führen Sie die Einnahme fort, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben.

Vorzeitiges Beenden/ Unterbrechen der Behandlung

Bei vorzeitigem Beenden oder Unterbrechung der Behandlung kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Nebenwirkungen:

Nebenwirkungen in Zusammenhang mit der Anwendung wurden bisher nicht beobachtet. Wenn Sie Nebenwirkungen an sich beobachten, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Meldung von Vorkommnissen:

Jedes schwerwiegende Vorkommnis in Verbindung mit dem Produkt muss dem Hersteller und den zuständigen Behörden des Mitgliedsstaates gemeldet werden.

5. Wie ist Magen-Darm-Entspannung Intensiv aufzubewahren?

Lagerungsbedingungen:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. In der Originalverpackung, bei 2 °C bis 25 °C (Raumtemperatur) und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Sie dürfen das Medizinprodukt nach dem auf der Faltschachtel bzw. dem Blister angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Zusammensetzung:

Wirksamer Bestandteil: 1 Kapsel enthält: Simeticon 250 mg
Sonstige Bestandteile: Carrageen, modifizierte Maisstärke, Glycerin, gereinigtes Wasser

Hinweis für Allergiker:

Gluten- und laktosefrei.

Inhalt:

20 Kapseln

© Mivolis intensív gyomor- és bélyugató

kapszula
Hatóanyag: szimeticon (250 mg).

Felnőtteknél és 15 évesnél idősebb gyermekeknél történő alkalmazásra. Terhesség és szoptatás alatt való szedésével kapcsolatban semmilyen aggály nem merül fel.

Olvassa el figyelmesen a teljes használati utasítást, mert fontos információkat tartalmaz az Ön számára.

Őrizz meg a használati utasítást. A benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Ha a felsorolt mellékhatások bármelyike súlyossá válik, vagy ha olyan mellékhatást tapasztal, amely nem szerepel a használati utasításban, kérjük, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ez a használati utasítás az alábbiakat tartalmazza:

1. Mi a **Mivolis intensív gyomor- és bélyugató**, és mire használják?
2. Mit kell figyelembe venni a **Mivolis intensív gyomor- és bélyugató** szedésé előtt?
3. Hogyan kell a **Mivolis intensív gyomor- és bélyugató** készítményt bevenni/alkalmazni?
4. Milyen mellékhatások fordulhatnak elő?
5. Hogyan kell a **Mivolis intensív gyomor- és bélyugató** készítményt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és további tudnivalók

1. MI A **Mivolis intensív gyomor- és bélyugató**, ÉS MIRE HASZNÁLJÁK?
 - Túlzott gázképződés és gázfelhalmozódás esetén a gyomor-bélrendszerben.
 - A gyomor-bélrendszer működésével kapcsolatos panaszok, például teltségérzet, korai jóllakottság-érzés, puffadás, bőfűgés és felfűvadás (bélkórágás, a bélgázok távozásá) esetén.

Rendeltetés:

Puffadás, teltségérzet és bőfűgés esetén. Gyomor- és bélyugató szer a gázképződés fizikai csökkentésére.

2. MIT KELL FIGYELEMBE VENNII A **Mivolis intensív gyomor- és bélyugató** SZÉDÉSÉ ELŐTT?

Ellenjavallatok:

– Más orvostechnikai eszközökkel vagy gyógyszerekkel való kölcsönhatása nem ismert.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Nem alkalmazható a szimetikonnal vagy valamely egyéb összetevővel szembeni túlérzékenység esetén.
- Újonnan feltűpő és hosszabb ideje fennálló hasi panaszok esetén forduljon orvoshoz a panaszok okainak felderítése és adott esetben a mögöttük meghúzódó, kezelést igénylő betegség diagnosztizálása érdekében.
- Az összetevők egyes ritka esetekben túlérzékenységi reakciót válthatnak ki.
- A feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza.
- 15 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

3. HOGYAN KELL A **Mivolis intenzív gyomor- és bélnyugtató** KÉSZÍTMÉNYT BEVENNI/ALKALMAZNI?

Ez a készítmény mindig pontosan a jelen használati utasításban leírtak szerint szedje. Ha bizonytalan az adagolás illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Az ajánlott adagolás az alábbi:

Gázképződéssel járó gyomor- és bélpanaszok esetén:

Felnőttek és 15 évén felüli gyermekek: napi 3-4 alkalommal 1 kapszula elegendő folyadékkal.

A kapszulát a panaszok megszűnéséig kell alkalmazni. A készítmény szükség esetén hosszabb időn keresztül is szedhető. Tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz, mert előfordulhat, hogy olyan betegség áll fenn, amely orvosi kivizsgálást igényel. Túladagolás (szándékos vagy véletlen)

A készítmény által okozott mérgezőkés nem ismertek. A szimetikon hatóanyag nem kerül be a véráramba.

Mire kell ügyelnie, ha túl kevés kapszulát vett be, vagy elfelejtette bevenni a készítményt?

A következő alkalommal ne vegyen be kétszeres mennyiséget, hanem az adagolási útmutatóban leírtak szerint folytassa a kapszula szedését.

A kezelés idő előtti befejezése/megszakítása

A kezelés idő előtti befejezése/megszakítása esetén a panaszai visszatérhetnek.

4. MIYEN MELLÉKHATÁSOK FORDULHATNAK ELŐ?

Mellékhatások:

A készítmény alkalmazásával kapcsolatban mindeztidőig nem figyeltek meg semmilyen mellékhatást. Ha valamilyen mellékhatást észlelné magán, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

Az események jelentése:

A készítménnyel kapcsolatos minden súlyos váratlan eseményt be kell jelenteni a gyártónak és a tagállam illetékes hatóságainak.

5. HOGYAN KELL A **Mivolis intenzív gyomor- és bélnyugtató** KÉSZÍTMÉNYT TÁROLNI?

Tárolási feltételek:

Gyermekek elől elzárandó.

Az eredeti csomagolásban 2 °C és 25 °C között (szobahőmérsékleten), nedvségtől védve tárolandó.

A dobozon, illetve a buboréksomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza a készítményt. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Összetétel: Tartóanyag: 1 kapszula 250 mg szimetikont tartalmaz.

Egyéb összetevők: karragén, módosított kukoricakeményítő, glicerin, tisztított víz.

Megjegyzés az allergiások számára: Glutén- és laktózmentes.

Tartalma: 20 kapszula.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2024. szeptember

® **Mivolis intenzív pentru relaxare gastrointestinală**

Capsule

Componentă activă: simeticonă (250 mg)

Pentru utilizare la adulți și copii cu vârsta peste 15 ani.

Nu există contraindicații cu privire la administrare în timpul sarcinii și alăptării. Citiți cu atenție și în întregime indicațiile de utilizare, întrucât acestea conțin informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați indicațiile de utilizare. Poate durați să le recitiți mai târziu.

Dacă oricare dintre efectele secundare enumerate vă afectează semnificativ sau dacă observați efecte secundare care nu sunt enumerate în aceste indicații de utilizare, vă rugăm să vă informați medicul sau farmacistul.

Aceste informații de utilizare cuprind:

1. Ce este **Mivolis intenzív pentru relaxare gastrointestinală** și la ce este utilizat?
2. Ce trebuie să aveți în vedere înainte de a lua **Mivolis intenzív pentru relaxare gastrointestinală**?
3. Cum trebuie luat/utilizat **Mivolis intenzív pentru relaxare gastrointestinală**?
4. Ce efecte secundare sunt posibile?

Vertrieb durch/Forgalmazza/
Distribuție prin:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.at

Vertrieb in Österreich/Forgalmazó
Ausztriában/Distribuție în Austria:
dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

5. Cum trebuie păstrat **Mivolis intenzív pentru relaxare gastrointestinală**?
6. Ce conține ambalajul și informații suplimentare.

1. CE ESTE **Mivolis intenzív pentru relaxare gastrointestinală** ȘI LA CE ESTE UTILIZAT?
Pentru formarea excesivă de gaze și acumularea de gaze în tractul gastrointestinal Pentru tulburări gastrointestinale funcționale, cum ar fi senzația de preaplin, sașietate prematură, flatulență, eructație, meteorism (zgomot intestinal, eliberare de gaze intestinale)
Scopul utilizării:
În caz de flatulență, senzație de sașietate și eructație. Remediul gastrointestinal în vederea dezințării printr-un proces fizic a spumei formate la nivel gastrointestinal.

2. CE TREBUIE SĂ AVEȚI ÎN VEDERE ÎNAINTE DE A LUA **Mivolis intenzív pentru relaxare gastrointestinală** ?

Contraindicații:

- Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte produse medicale sau medicamente. Atenționări și măsuri de precauție:

- Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la simeticonă sau la oricare dintre celelalte ingrediente.

Dacă vă confrunțați cu un disconfort abdominal ce a intervenit de curând și este persistent, trebuie să consultați un medic pentru a putea diagnostica cauza disconfortului și eventual, boala ce stă la baza acestui disconfort și care necesită tratament.

- În cazuri rare, pot apărea reacții de hipersensibilitate cauzate de ingrediente.

- Nu utilizați după data de expirare indicată

- Nu este adecvat pentru copii cu vârsta sub 15 ani

3. CUM TREBUIE LUAT/UTILIZAT **Mivolis intenzív pentru relaxare gastrointestinală** ?

Luați întotdeauna exact produs medical exact așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este:

pentru tulburările gastrointestinale legate de gaze:

adulți și copii cu vârsta peste 15 ani: de 3-4 ori pe zi câte o capsulă cu suficiente lichide.

Durata de utilizare depinde de evoluția simptomelor. Dacă este necesar, produsul poate fi luat pe o perioadă mai lungă de timp. Trebuie consultat un medic în cazul unor tulburări persistente, deoarece ar putea fi vorba de o boală care necesită investigații medicale.

Supradozare (intenționată sau accidentală)

Nu sunt cunoscute intoxicații prin intermediul produsului. Substanța activă simeticonă nu este absorbită în sânge.

La ce trebuie să fiți atenți dacă ați luat prea puțin sau ați uitat să îl luați capsulele? Nu dublați cantitatea data viitoare, ci continuați să administrați așa cum este descris în instrucțiunile de dozare.

Încetarea/Întreruperea prematură a tratamentului

Încetarea prematură sau întreruperea tratamentului poate duce la reapariția simptomelor.

4. CE EFECTE SECUNDARE SUNT POSIBILE?

Efecte secundare:

nu se cunosc efecte secundare legate de utilizare. Dacă vă confrunțați cu efecte secundare, vă rugăm să informați medicul sau farmacistul.

Raportarea incidentelor:

orice incident grav legat de produs trebuie să fie raportat producătorului și autorităților competente ale statului membru.

5. CUM TREBUIE PĂSTRAT **Mivolis intenzív pentru relaxare gastrointestinală**?

Condiții de depozitare: a nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra în ambalajul original la o temperatură cuprinsă între 2 °C și 25 °C (temperatura ambientală) și ferit de umezeală.

Nu trebuie să utilizați produsul medical după data de expirare indicată pe cutia pliaabilă, respectiv pe blister. Data expirării se referă la ultima zi a lunii indicate.

6. CE CONȚINE AMBALAJUL ȘI INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Componente:

Componentă activă:

1 capsulă conține: simeticonă 250 mg

Alte componente: caragenan, amidon de porumb modificat, glicerină, apă purificată

Indicații pentru alergici:

fără gluten și lactoză.

Conține: 20 de capsule

Data de referință a informației: 2024-09



Dr. Kleine Pharma GmbH
Heidsieker Heide 114
DE-33739 Bielefeld



444_REV01/G02