

Medizinprodukt Magentabletten

Liebe Patientin, lieber Patient,

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Einnahme von **Mivolis Magentabletten** sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Medizinprodukt ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen **Mivolis Magentabletten** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Zusammensetzung: Eine Magentablette enthält als Wirkstoff 68 % Calciumcarbonat und 15 % Magnesiumcarbonat.
Sonstige Bestandteile: Sorbit, Inulin, Magnesiumstearat, Maisstärke, Aroma Pfefferminz, Aroma Zitrone, Sucralose.
Darreichungsform und Inhalt: 60 Tabletten à 1 g = 60 g

Zweckbestimmung: Zur symptomatischen Behandlung von Sodbrennen, saurem Aufstoßen und säurebedingten Magenbeschwerden.

Gegenanzeigen: Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe, insbesondere bei einer Überempfindlichkeit gegenüber Sorbit oder Fruktose (Fructoseintoleranz), sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Wenn bei Ihnen eine der folgenden Störungen vorliegt, sollten Sie **Mivolis Magentabletten** nicht anwenden:

- Erhöhtem Calciumspiegel (Hypercalcämie)
- Nierenproblemen/eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatinin clearance unter 30 ml/min)
- Niedrigem Phosphatspiegel im Blut
- Erhöhte Calciumausscheidung

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Es wird empfohlen **Mivolis Magentabletten** nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln anzuwenden, sondern bei der Einnahme einen zeitlichen Abstand von ca. 2 Stunden einzuhalten, damit deren Wirkungsweise nicht beeinträchtigt wird.

Hinweis: Die gleichzeitige Einnahme von Arzneimitteln mit calcium- bzw. magnesiumhaltigen Produkten wie **Mivolis Magentabletten**, aber auch von calciumhaltigen Nahrungsmitteln wie z. B. Milchprodukten kann die Resorption einiger Arzneimittel beeinflussen. Die Aufnahme von bestimmten Antibiotika wie Chinolone und Tetracycline kann durch die Anwesenheit von Calcium verringert werden, sodass diese nicht mehr ausreichend wirken können. Wenn die Ärztin, der Arzt Ihnen Antibiotika verordnet, sollten Sie sie, ihn um Rat fragen, auf welche calciumfreien Antacida Sie ausweichen können. Weitere Arzneimittel, deren Resorption durch calciumhaltige Produkte eingeschränkt werden können sind Biphosphonate, Levothyroxin, Diltiazem, Verapamil, Thiaziddiuretika sowie Präparate die Digitalisglycoside, Lithium oder Aluminium enthalten.

Wenn Sie solche Medikamente oder Medikamente gegen Bluthochdruck (Calciumkanalblocker und thiazidhaltige Arzneimittel) einnehmen, fragen Sie bitte **vor der Anwendung von Mivolis Magentabletten Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.**

Nebenwirkungen: Mögliche Nebenwirkungen, die auftreten können, wenn Magentabletten in hoher Dosierung über einen sehr langen Zeitraum eingenommen werden und bei Ihnen eine Niereninsuffizienz vorliegt, sind eine Erhöhung des Calciumspiegels im Blut, eine Störung des Säure-Basehaushaltes (metabolische Alkalose) und eine Verringerung des Phosphatgehaltes im Blut (Hypophosphatämie). Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen ist die Behandlung abzubrechen.

Sollten Sie wider Erwarten Nebenwirkungen bei sich beobachten, so informieren Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apotheke.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Deutschland Website: www.bfarm.de oder dem Hersteller melden.

Vorsichtsmaßnahmen: Die längere Anwendung hoher Dosierungen kann zu einer potentiell schwerwiegenden Erkrankung führen – dem sogenannten Milch-Alkali-Syndrom oder Burnett-Syndrom. Die Krankheit geht einher mit verminderter Nierenfunktion, erhöhtem Calciumspiegel im Blut und äußert sich in Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Muskelschwäche, Benommenheit, Schwindel und Verwirrung.

Was müssen Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit, sowie bei Kindern beachten?

In der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit der Ärztin, dem Arzt anwenden. Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Wie sollten Sie **Mivolis Magentabletten** anwenden? Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei säurebedingten Magenbeschwerden oder Sodbrennen je nach Bedarf 1–2 Tabletten – vorzugsweise ca. 1 Stunde nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen ein. In Abhängigkeit vom Auftreten der Symptome können Sie **Mivolis Magentabletten** auch zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Bei Bedarf können bis zu 6 Tabletten pro Tag eingenommen werden. Die Tabletten können gekaut oder getrunken werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie **Mivolis Magentabletten** einnehmen sollen, fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Nicht länger als 14 Tage ohne Unterbrechung einnehmen und nicht mehr als 6 Tabletten täglich.

Lagerungs- und Haltbarkeitshinweise:

Das Verfallsdatum –  ist auf der Faltschachtel und dem Blister angebracht. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum.



Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Stand der Information: 08.2025

SK Tablety na žalúdok

Zdravotnická pomôcka

Pred použitím **Mivolis tablet** na žalúdok si pozorne prečítajte návod na použitie, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Táto zdravotnícka pomôcka je dostupná bez lekárskeho predpisu. Aby sa však dosiahlo čo najlepší výsledok pri používaní, musia sa **Mivolis tablety na žalúdok** používať podľa uvedených pokynov.

Zloženie: Jedna tableta obsahuje ako účinné zložky: 68 % uhličitanu vápenatého a 15 % uhličitanu horečnatého.

Ďalšie zložky: sorbitol, inulín, stearan horečnatý, kukuričný škrob, aróma máty piepornej, citrónová aróma, sukralóza.

Dávkovacia forma a obsah: 60 tableť po 1 g = 60 g

Účel určenia: Symptomatically oštenenie pálenia záhy, refluxu a žalúdočných ťažkosti súvisiacich so žalúdočnou kyselinou.

Kontraindikácie: Tento prípravok sa nesmie používať pri známej precitlivosti na niektorú zo zložiek, najmä pri precitlivosti na sorbitol alebo fruktózu (neznášanlivosť fruktózy).

Mivolis tablety na žalúdok by ste nemali používať, ak máte jednu z nasledujúcich porúch:

- zvýšená hladina vápnika (hyperkalcémia),
- problémy s obličkami/zhoršená funkcia obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min)
- nízke hladiny fosfátov v krvi
- zvýšené vylučovanie vápnika

Interakcie s liekmi: Aby sa nenarušal účinok liekov, odporúča sa neužívať **Mivolis tablety na žalúdok** v rovnakom čase ako lieky, ale s približne dvojhodinovým odstupom od ich podania.

Poznámka: Súčasné užívanie liekov s prípravkami obsahujúcimi vápnik alebo horčík, napr. s **Mivolis tabletami na žalúdok**, ako aj s potravinami obsahujúcimi vápnik, ako sú mliečne výrobky, môže ovplyvňovať vstrebávanie niektorých liekov. Prítomnosť vápnika môže znížiť vstrebávanie niektorých antibiotík, ako sú chinolóny a tetracyklíny, čím sa znižuje ich účinnosť. Ak vám lekár predpíše antibiotiká, mali by ste ho požiadať o radu ohľadom antacid bez obsahu vápnika. Medzi ďalšie lieky, ktorých absorpciu môžu znížiť prípravky obsahujúce vápnik, patria bisfosfonáty, levotyroxín, diltiazem, verapamil, tiažidové diuretiká a prípravky obsahujúce digitalisové glykozidy, lítium alebo hliník. Ak užívate takéto lieky alebo lieky na vysoký krvný tlak (blokátory kalciových kanálov a lieky s obsahom tiažidov), poraďte sa pred použitím **Mivolis tablety na žalúdok** so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Nežiaduce účinky: Medzi nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri užívaní **Mivolis tablet na žalúdok** vo vysokých dávkach po veľmi dlhú dobu a pri obličkovej nedostatočnosti, patrí zvýšenie hladiny vápnika v krvi, porucha acidobázickej rovnováhy (metabolická alkalóza) a zníženie obsahu fosfátov v krvi (hypofosfatémia). Ak sa vyskytnú reakcie z precitlivosti, užívanie prerušte. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek neočakávané nežiaduce účinky, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

Hlásenie nežiaducich účinkov: Ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. To platí aj pre nežiaduce účinky, neuvedené v tomto návode na použitie. Nežiaduce účinky môžete nahlásiť aj priamo výrobcovi alebo na ŠÚKL.

Preventívne opatrenia: Dlhodobé užívanie vysokých dávok môže viesť k potenciálne závažnému stavu známemu ako Burnettov syndróm (mliečno-alkalický syndróm). Tento chorobný stav sprevádza znížená funkcia obličiek a zvýšená hladina vápnika v krvi. Prejavuje sa bolesťami hlavy, nevoľnosťou, vracaním, svalovou slabosťou, ospalosťou, závratmi a zmätenosťou.

Na čo sa musí prihliadať počas tehotenstva a dojčenia, ako aj u detí?

Počas tehotenstva a dojčenia tablety používajte len po konzultácii s lekárom. Prípravok nepoužívajte u detí mladších ako 12 rokov.

Dávkovanie, spôsob a dĺžka používania: Dospelí a dospievajúci od 12 rokov užívajú pri žalúdočných ťažkostiach súvisiacich s kyselinou alebo pri pálení záhy podľa potreby 1-2 tablety – najlepšie približne 1 hodinu po jedle a pred spaním. V závislosti od výskytu príznakov sa môžu **Mivolis tablety na žalúdok** užívať aj medzi jedlom. V prípade potreby možno užívať až 6 tableť denne. Tablety sa môžu žuť alebo cmúľať. Ak s istotou neviete, ako **Mivolis tablety na žalúdok** používať, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Nepoužívajte dlhšie ako 14 dní bez prerušenia a neužívajte viac ako 6 tableť denne.

Informácie o skladovaní a o dobe použiteľnosti:

Dátum spotreby  je uvedený na škatulke a blistri.

Po tomto dátume výrobok už nepoužívajte.



Uchovávať mimo dosahu detí.
Stav informácií: 08/2025

PL Tabletki na żołądek

Wybró medyczny

Instrukcja używania: Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję używania, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla użytkownika. Niniejszy produkt leczniczy jest dostępny bez recepty. Aby osiągnąć najlepszy możliwy sukces leczenia, tabletki na żołądek muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami.

Należy zachować instrukcję używania. Być może będzie warto przeczytać ją ponownie później. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub porady, należy skontaktować się z apteką. Jeśli wystąpią nasilające się lub nie ustępujące dolegliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład: Jedna tabletki na żołądek zawiera jako substancję czynną 68 % węglań wapnia i 15 % węglań magnezu.

Pozostałe składniki: sorbitol, inulina, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana, aromat miętowy, aromat cytrynowy, sukraloza.

Forma dawkowania i zawartość: 60 tabl. à 1 g = 60 g

Przewidziane zastosowanie: W leczeniu objawowym zgagi, cofania się kwaśnych treści żołądkowych i dolegliwości żołądkowych spowodowanych nadkwaśnością.

Przeciwwskazania: W przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, w szczególności nadwrażliwości na sorbitol lub fruktozę (nieterolieracja fruktozy), nie należy stosować produktu.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów nie wolno stosować **tabletek na żołądek:**

- Podwyższony poziom wapnia (hiperkalcemia)
- Zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min)
- Niski poziom fosforu we krwi
- Zwiększone wydalanie wapnia

Wzajemne oddziaływanie: Zaleca się, aby **tabletek na żołądek** nie stosować jednocześnie z lekami, ale zachować około 2 godziny przerwy między ich przyjęciem, aby nie zaburzyć ich działania.

Wskazówki: Jednoczesne przyjmowanie leków lub wyrobów medycznych zawierających wapń lub magnez, takich jak **tabletki na żołądek**, jak również pokarmów zawierających wapń, np. produktów mlecznych, może wpłynąć na wchłanianie niektórych leków. Przyjmowanie niektórych antybiotyków, takich jak chinolony i tetracykliny, może być ograniczone przez obecność wapnia, co powoduje, że nie działają one wystarczająco skutecznie. Jeśli lekarz zaleci antybiotyki, należy zapytać go o radę, jakie leki zobojętniające kwasy bez zawartości wapnia można stosować zamiast tabletek na odek. Inne leki, których wchłanianie może być ograniczone przez produkty zawierające wapń, to bisfosfony, levotyroxyna, diltiazem, werapamil, diuretyki tiażidowe oraz preparaty zawierające glikozydy naparstnicy, lit lub glin. Jeśli pacjent przyjmuje takie leki lub leki na nadciśnienie (blokery kanatu wapniowego i leki zawierające tiażydy), przed zastosowaniem **tabletek na żołądek** należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Efekty uboczne: Możliwe działania niepożądane, które mogą wystąpić w przypadku przyjmowania tabletek na żołądek w dużych dawkach przez bardzo długi czas i u pacjentów z niewydolnością nerek, to: wzrost stężenia wapnia we krwi, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (alkalozia metaboliczna) oraz zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi (hipofosfatemia).

Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości, należy przerwać leczenie.

Jeśli, wbrew oczekiwaniom, wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie skutków ubocznych: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również działań niepożądanych, które nie zostały określone w niniejszej instrukcji używania. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do producenta.

Środki ostrożności: Długotrwałe stosowanie wysokich dawek może prowadzić do potencjalnie poważnej choroby – tzw. zespołu mleczno-alkalicznego lub zespołu Burnett. Choroba ta towarzyszy upośledzeniu funkcji nerek, podwyższonemu poziomowi wapnia we krwi i objawia się bólami głowy, nudnościami, wymiotami, osłabieniem mięśni, sennością, zawrotami głowy i dezorientacją.

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także dzieci?
W okresie ciąży i karmienia piersią stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Instrukcje dawkowania, rodzaj i czas stosowania

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia w razie dolegliwości żołądkowych spowodowanych nadkwaśnością lub zgagą przyjmują w razie potrzeby 1-2 tabletki – najlepiej około 1 godzinę po posiłku i przed snem.

W zależności od wystąpienia objawów **tabletki na żołądek** można przyjmować również między posiłkami.

W razie potrzeby można przyjmować do 6 tabletek dziennie. Tabletki można żuć lub ssać.

W razie wątpliwości dotyczących stosowania **tabletek na żołądek** należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez przerwy i nie więcej niż 6 tabletek dziennie.

Wskazówki dotyczące przechowywania i okresu trwałości

Datę ważności  zamieszczono na składanym pudełku i blistrze. Nie należy używać produktu po tej dacie.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Czy spodobał Ci się produkt?
Jeśli masz jakieś sugestie lub prośby, skontaktuj się z producentem.

Ostatnia aktualizacja ulotki 08/2025

🇨🇪 Žaludeční tablety

Zdravotnický prostředek a / nebo

Návod k použití: Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití, protože obsahuje pro vás důležité informace. Tento zdravotnický produkt je dostupný bez lékařského předpisu. Aby však bylo dosaženo co nejlepšího úspěchu léčby, je nutné žaludeční tablety správně používat. Návod k použití uschovejte. Možná si jej budete chtít přečíst později znovu. Pokud potřebujete další informace nebo radu, zeptejte se v lékárně. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Složení: Jedna žaludeční tableta obsahuje 68% uhlíkatou vápenatou a 15% uhlíkatou hořečnatou jako účinné látky. Jiné složky: sorbitol, inulin, stearan hořečnatý, kukuřičný škrob, aroma máty peprné, citronové aroma, sukralóza.

Léková forma a obsah: 60 tablet à 1 g = 60 g

Účinní účelů: K symptomatické léčbě pálení žáhy, refluxu a žaludečních potíží souvisejících s kyselinou.

Kontraindikace: Přípravek by se neměl používat při známé přecitlivělosti na některou ze složek, zejména při přecitlivělosti na sorbitol nebo fruktózu (intolerance fruktózy).

Pokud trpíte některou z následujících poruch, neměli byste **žaludeční tablety** užívat:

- Zvýšená hladina vápníku (hyperkalcémie)
 - Problémy s ledvinami/omezená funkce ledvin (clearance kreatininu nižší než 30 ml/min)
 - Nízká hladina fosfátů v krvi
- Zvýšené vylučování vápníku.

Interakce: Doporučuje se neužívat **žaludeční tablety** současně s léky, ale užívat je s odstupem asi 2 hodin, aby nebyl oslaben jejich účinek.

Upozornění: Současné užívání léků s přípravky obsahujícími vápník nebo hořčík, jako jsou **žaludeční tablety**, ale také potraviny obsahující vápník, jako jsou mléčné výrobky, mohou ovlivnit vstřebávání některých léků.

Vstřebávání některých antibiotik, jako jsou chinolony a tetracykliny, může být sníženo přítomností vápníku, takže již nemohou být dostatečně účinná. Pokud vám lékař předepíše antibiotika, měli byste ho požádat o radu, na která antacida bez vápníku můžete přejít.

Dalšími léky, jejichž absorpci mohou omezovat přípravky obsahující vápník, jsou bifosfonáty, levotyroxin, diltiazem, verapamil, thiazidová diuretika a přípravky obsahující digitalisové glykosidy, lithium nebo hliník. Pokud užíváte takové léky nebo léky na vysoký krevní tlak (blokátory kalciových kanálů a léky obsahující thiazidy), poraďte se před užitím **žaludečních tablet** se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vedlejší účinky: Možné nežádoucí účinky, které se mohou objevit, pokud jsou žaludeční tablety užívány ve vysokých dávkách po velmi dlouhou dobu a máte renální insuficienci, jsou: zvýšení hladiny vápníku v krvi, porucha acidobazické rovnováhy (metabolická alkalóza) a snížení obsahu fosfátů v krvi (hypofosfatémie). Pokud se objeví hypersenzitivní reakce, léčba by měla být přerušena.

Pokud nazýváte očekávané zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Hlášení nežádoucích účinků: Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, kontaktujte svého lékaře či lékárníka. To platí i pro nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo výrobcí.

Preventivní opatření: Dlouhodobé užívání vysokých dávek může vést k potenciálně závažnému stavu známému jako mléčné-alkalický syndrom nebo Burnettův syndrom. Onemocnění provází snížená funkce ledvin, zvýšená hladina vápníku v krvi a projevuje se bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, svalovou slabostí, ospalostí, závratěmi a zmateností.

Na co je třeba dbát během těhotenství a kojení, stejně jako u dětí?

Během těhotenství a kojení používejte pouze po konzultaci s lékařem.

Nepoužívejte u dětí mladších 12 let.

Pokyny k dávkování, typ a doba aplikace

Dospělí a mladiství od 12 let užívají 1-2 tablety podle potřeby při žaludečních potížích nebo pálení žáhy – nejlépe asi 1 hodinu po jídle a před spaním.


V závislosti na nástupu příznaků můžete také užívat **žaludeční tablety** mezi jídly.

V případě potřeby lze užívat až 6 tablet denně. Tablety lze žvýkat nebo cucat.

Pokud si nejste jisti, jak **žaludeční tablety** užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Neužívejte déle než 14 dní bez přerušování a neužívejte více než 6 tablet denně.

Informace o skladování a trvanlivosti

Datum spotřeby  je uvedeno na krabičce a na blisteru. Produkt nikdy nepoužívejte po tomto datu.



Skladujte mimo dosah dětí.

Líbí se Vám tento produkt?

JMáte-li podněty nebo přání, obraťte se laskavě na výrobce
Stav informací 08/2025

🇷🇴 Comprimate pentru stomac

Dispozitiv medical

Instrucțiuni de utilizare: Instrucțiunile de utilizare trebuie citite cu atenție înainte de folosire, deoarece conțin informații importante pentru dumneavoastră. Acest dispozitiv medical este disponibil fără prescripție medicală. Pentru a obține cele mai bune rezultate în tratament, este esențial ca produsul să fie utilizat conform instrucțiunilor.

Păstrați acest manual. Este posibil să doriți să-l recitiți mai târziu. Întrebați la farmacie dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de sfaturi. Dacă simptomele se agravează sau nu apar îmbunătățiri, consultați medicul dumneavoastră sau farmacia.

Compoziție: 68% carbonat de calciu și 15% carbonat de magneziu.

Alte componente: sorbitol, inulină, stearat de magneziu, amidon de porumb, aromă de mentă, aromă de lămâie, sucraloză.

Formă de prezentare și conținut: 60 comprimate de 1 g = 60 g

Utilizare intenționată: Pentru tratamentul simptomatic al arsurilor la stomac, regurgitării acide și al disconfortului gastric cauzat de acid.

Contraindicații: În caz de hipersensibilitate cunoscută la unul dintre ingredientele, în special la sorbitol sau fructoză (intoleranță la fructoză), produsul nu trebuie utilizat.

Dacă suferiți de una dintre următoarele afecțiuni, nu trebuie să utilizați comprimatele pentru stomac:

- Nivel crescut de calciu în sânge (hipercalcemie)
 - Probleme renale/funcție renală redusă (clearance-ul creatininei sub 30 ml/min)
 - Nivel scăzut de fosfat în sânge
- Excreție crescută de calciu.

Interacțiuni: Se recomandă să nu se administreze în același timp cu alte medicamente, ci să se păstreze un interval de aproximativ 2 ore între administrări, pentru a nu afecta modul de acțiune al acestora.

Notă: Administrarea simultană a medicamentelor împreună cu produse care conțin calciu sau magneziu, cum ar fi **comprimatele pentru stomac**, dar și alimente bogate în calciu, de exemplu produsele lactate, poate influența absorbția unor medicamente. Absorbția anumitor antibiotice, cum ar fi chinolonele și tetraciclinele, poate fi redusă de prezența calciului, ceea ce poate duce la scăderea eficacității acestora. Dacă medicul sau medicul dumneavoastră vă prescrie antibiotice, ar trebui să îl cereți sfatul despre ce antiacid fără calciu puteți folosi.

Alte medicamente a căror absorbție poate fi redusă de produsele care conțin calciu sunt bifosfonatii, levitroxina, diltiazemul, verapamilul, diureticele tiazidice, precum și preparatele care conțin digitalis glicozide, litiu sau aluminiu. Dacă luați astfel de medicamente sau medicamente pentru hipertensiune arterială (blocante ale canalelor de calciu și medicamente care conțin tiazide), vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a folosi **comprimatele pentru stomac**.

Efecte secundare: Posibile efecte secundare care pot apărea dacă comprimatele pentru stomac sunt luate în doze mari pe o perioadă foarte lungă și dacă aveți insuficiență renală sunt: creșterea nivelului de calciu din sânge, tulburări ale echilibrului acido-bazic (alkaloză metabolică) și scăderea nivelului de fosfați din sânge (hipofosfatemie). Dacă apar reacții de hipersensibilitate, trebuie întreruptă utilizarea produsului.

Dacă observați efecte secundare neașteptate, informați-vă medicul, farmacistul sau contactați farmacia.

Raportarea efectelor secundare: Dacă observați efecte secundare, contactați medicul, farmacistul sau farmacia dumneavoastră. Acestea includ și efecte secundare care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct producătorului.

Măsuri de precauție: Utilizarea prelungită a dozelor mari poate duce la o afecțiune potențial gravă – sindromul lactat-alkalic sau sindromul Burnett. Boala este însoțită de o funcție renală redusă, creșterea nivelului de calciu în sânge și se manifestă prin dureri de cap, greață, vărsături, slăbiciune musculară, amețeli, confuzie și vertij.

Ce trebuie să știți despre utilizarea în timpul sarcinii și alăptării, precum și pentru utilizarea la copii:

În timpul sarcinii și alăptării, utilizați numai după consultarea medicului.

A nu li se administra copiilor sub 12 ani.

Instrucțiuni de dozare, mod de administrare și durată a tratamentului

Adulții și adolescenții peste 12 ani iau, după necesitate, 1-2 comprimate pentru durerile gastrice cauzate de acid sau arsuri la stomac – de preferat aproximativ 1 oră după mese și înainte de culcare.

În funcție de apariția simptomelor, puteți lua comprimatele pentru stomac și între mese.

La nevoie, pot fi luate până la 6 comprimate pe zi. Comprimatele pot fi mestecate sau ținute să se dizolve lent în gură.

Dacă nu sunteți sigur(ă) cum să luați **comprimatele pentru stomac**, întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu luați mai mult de 14 zile consecutiv și nu depășiți 6 comprimate pe zi.

Instrucțiuni de păstrare și valabilitate

Data de expirare  este menționată pe ambalajul pliabli și pe blister. Nu utilizați produsul după această dată.












A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor.

V-a plăcut produsul?

Pentru sugestii sau întrebări, vă rugăm să contactați producătorul.
Stadiul informațiilor 08/2025

🇩🇪 Bedeutung der Symbole auf der Verpackung: / 🇸🇰 Vysvetlenie symbolov: / 🇵🇱 objaśnienie symboli / 🇨🇪 Vysvětlení symbolů / 🇷🇴 Descrierea simbolurilor

 🇩🇪 Hersteller 🇸🇰 Výrobca 🇵🇱 Producent 🇨🇪 Výrobce 🇷🇴 Producător	 🇩🇪 Chargenbezeichnung 🇸🇰 Číslo šarže 🇵🇱 Numer partii 🇨🇪 Číslo šarže 🇷🇴 Număr lot	 🇩🇪 Verwendbar bis 🇸🇰 Môže sa používať do 🇵🇱 Termin przydatności do użycia 🇨🇪 Použitelné do 🇷🇴 Valabil până la
 🇩🇪 Trocken aufbewahren 🇸🇰 Uchovávať v suchu 🇵🇱 Przechowywać w suchym miejscu 🇨🇪 Skladujte v suchu 🇷🇴 Depozitați la loc uscat	 🇩🇪 Zwischen 5 °C und 25 °C lagern 🇸🇰 Skladujte pri teplote od 5 °C do 25 °C 🇵🇱 Przechowywać w temperaturze od 5 °C do 25 °C 🇨🇪 Uchovávejte při teplotě od 5 °C do 25 °C 🇷🇴 Depozitați la temperaturi între 5 °C și 25 °C	 🇩🇪 Bitte Gebrauchsanweisung beachten 🇸🇰 Postupujte podľa návodu na použitie 🇵🇱 Przestrzegaj instrukcji używania 🇨🇪 Postupujte podle návodu k použití 🇷🇴 Respectați instrucțiunile de utilizare
 🇩🇪 Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. 🇸🇰 Nepoužívajte, ak je obal poškodený. 🇵🇱 Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania. 🇨🇪 Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. 🇷🇴 Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat.	 🇩🇪 Übereinstimmung mit dem Medizinproduktegesetz 🇸🇰 Súlad so zákonom o zdravotníckych pomôckach 🇵🇱 Zgodność z ustawą o wyrobach medycznych 🇨🇪 Shoda se zákonem o zdravotnických prostředcích 🇷🇴 Conform cu legile privind dispozitivele medicale	 🇩🇪 Medizinprodukt 🇸🇰 Zdravotnícka pomôčka 🇵🇱 Produkt leczniczy 🇨🇪 Zdravotnický produkt 🇷🇴 Dispozitiv medical

► Hergestellt in Deutschland

Vertrieb durch/distribucia cez/dystrybucja przez/
distribucija/distribucija prin
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Vertrieb in Österreich/Distribucija v Rakúsku/
Dystrybucja w Austrii/Distribucija v Rakousku/
Distribucija în Austria
dm-drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

 Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1
33161 Hövelhof, Germany
www.hedenkamp.de



176059/001-072025