



Medizinprodukt

# Hustenpastillen mit Spitzwegerich

**Gebrauchsanweisung:**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen darüber, was bei der Anwendung dieses Medizinproduktes zu beachten ist.

Zusammensetzung:

**Eine Pastille enthält:** Spitzwegerich Dickextrakt (100 mg), Arabisches Gummi (Acacia senegal), Maltitol, Sorbitol, Johannisbeeraroma, Waldbeearoma, Citronensäure, Ascorbinsäure, mittelkettige Triglyceride, Acesulfam K, Wasser.

**Gluten- und laktosefrei. Vegan. Ohne Fructose.**

**Darreichungsform und Inhalt:**

Lutschpastillen, Originalpackung mit 30 Pastillen zum Lutschen.

**Anwendungsgebiete:**

Zur Reizlinderung bei Husten, Heiserkeit und rauem Hals sowie zur unterstützenden Behandlung bei Schleimhautentzündung im Mund-, Hals- und Rachenbereich.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Wie oft und in welcher Menge sollten Sie die Hustenpastillen mit Spitzwegerich anwenden?**

Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Bei den ersten Anzeichen von Beschwerden wie z. B. rauem Hals, Schluckbeschwerden oder Hustenreiz sollten Sie nach Bedarf mehrmals täglich 1–2 Hustenpastillen langsam im Mund zergehen lassen. Die maximale Dosierung von 10 Pastillen täglich sollte nicht überschritten werden.

Das Produkt kann problemlos über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

**Hinweis:**

Sollten sich die Beschwerden nach einigen Tagen nicht gebessert haben, so empfehlen wir, einen Arzt aufzusuchen.

**Hinweis für Diabetiker:**

Eine Lutschpastille enthält 0,87 g Kohlenhydrate entsprechend 0,073 BE.

**Nebenwirkungen:**

Sehr selten können Magenbeschwerden oder Blähungen auftreten. Durch den Gehalt an Maltitol und Sorbitol kann eine abführende Wirkung bei übermäßigem Verzehr auftreten.

**Wechselwirkungen:**

Eine Wechselwirkung mit anderen Mitteln ist nicht bekannt. Trotzdem sollte das Produkt nicht unmittelbar mit anderen medizinischen Produkten oder Produkten des täglichen Bedarfs in der Mundhöhle angewendet werden. Auf einen Zeitabstand von mindestens 30 Minuten ist zu achten.

**Gegenanzeigen:**

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe sollten Hustenpastillen mit Spitzwegerich nicht angewendet werden.

Dieses Medizinprodukt enthält Maltitol und Sorbitol. Bitte nehmen Sie es erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Was müssen Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern beachten?**

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollten Hustenpastillen mit Spitzwegerich nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Die Hustenpastillen mit Spitzwegerich sind nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.

**Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise:**

**Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?**

Durch den Gehalt an Sorbitol/Maltitol kann eine leichte Abführwirkung bei übermäßigem Gebrauch auftreten. Wenn innerhalb von 7 Tagen keine Besserung der Beschwerden eintritt oder ein Verdacht auf eine ernsthafte Erkrankung besteht, ist dringend medizinischer Rat einzuholen.

Stand der Information: Juli 2020

☾ Medicinski pripomoček

## Mivolis Pastile Proti Kašlju S Trpotcem

**Navodilo za uporabo:**

Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije o tem, kaj morate upoštevati pri uporabi tega medicinskega pripomočka.

Sestava:

**Ena pastila vsebuje:** izvleček trpotca (100 mg), Arabski gumi (Acacia senegal), maltitol, sorbitol, aroma črnega ribeza, aroma gozdnih jagod, citronska kislina, askorbinska kislina, srednjeverzični trigliceridi, acesulfam K, voda.

**Brez glutena in laktoze. Primerno za vegane. Brez fruktoze**

**Oblika in vsebina zdravila:**

Pastile za lizanje, originalna embalaža z 30 pastil za lizanje.

**Področja uporabe:**

Za lajšanje draženja pri kašlju, hripavosti in vnetem grlu ter kot podporno zdravljenje pri vnetju sluznice v ustni votlini, žrelu in grlu.

**Navodila za odmerjanje, način in trajanje uporabe:**

**Kako pogosto in v kakšni količini naj uporabljate pastile proti kašlju z ozkolistnim trpotcem?**

Za odraste in otroke, starejše od 6 let.

Ob prvih znakih težav, kot so vneto grlo, težave pri požiranju ali dražec kašelj, počasni raztopite 1–2 pastili v ustih večkrat na dan, po potrebi. Največji dnevni odmerek 10 pastil ne sme biti presežen. Izdelek se lahko brez težav uporablja daljše časovno obdobje.

**Opomba:**

Če se težave po nekaj dneh ne izboljšajo, priporočamo, da se posvetujete z zdravnikom.

**Opomba za diabetike:**

Ena pastila za lizanje vsebuje 0,87 g ogljikovih hidratov.

**Neželeni učinki:**

Zelo redko lahko pride do želodčnih težav ali napenjanja. Zaradi vsebnosti maltitola in sorbitola se lahko ob prekomernem uživanju pojavi odvajalni učinek.

**Medsebojno delovanje z drugimi zdravili:**

Ni znanih medsebojnih delovanj z drugimi zdravili. Kljub temu izdelka ne smete uporabljati hkrati z drugimi zdravili ali vsakodnevnimi izdelki v ustni votlini. Priporočljiv je časovni razmik vsaj 30 minut med posameznimi uporabi.

**Kontraindikacije:**

Če ste preobčutljivi na katero koli sestavino izdelka, pastil proti kašlju z ozkolistnim trpotcem ne smete uporabljati.

To medicinsko sredstvo vsebuje maltitol in sorbitol. Če veste, da imate intoleranco na nekatere sladkorje, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

**Kaj je treba upoštevati med nosečnostjo, dojenjem in pri otrocih?**

Ker ni na voljo dovolj raziskav, pastil proti kašlju z ozkolistnim trpotcem med nosečnostjo in dojenjem ne smete uporabljati. Pastile niso primerne za otroke, mlajše od 6 let.

**Varnostni ukrepi in posebna opozorila:**

**Katere varnostne ukrepe je treba upoštevati?**

Zaradi vsebnosti sorbitola in maltitola se lahko ob prekomerni uporabi pojavi blag odvajalni učinek. Če v 7 dneh ne pride do izboljšanja težav ali če obstaja sum na resno bolezen, je nujno poiskati zdravniško pomoč.

Stanje informacij: 07/2020

☞ **Gebrauchsanweisung: Information für den Anwender**

☾ **Navodilo za uporabo: Informacije za uporabnika**

☛ **Foglioletto illustrativo: Informazioni per l'utilizzatore**

☞ **Felhasználási útmutató: Tájékoztató a felhasználó számára**

☞ **Instrucțiuni de utilizare: Informații pentru utilizator**

☛ **Návod k použití: Informace pro uživatele**

☛ **Instrukcja użycia: Informacje dla użytkownika**

☛ **Návod na použitie: Informácie pre používateľa**



Ⓜ Dispositivo medico

## Mivolis pastiglie per la tosse con piantaggine

Foglioletto illustrativo. Leggere attentamente.

Composizione:

**Una pastiglia contiene:** estratto spesso di piantaggine (100 mg), gomma arabica (Acacia senegal), maltitolo, sorbitolo, aroma di ribes nero, aroma di frutti di bosco, acido citrico, acido ascorbico, trigliceridi a catena media, acesulfame K, acqua.

**Senza glutine e lattosio. Vegano. Senza fruttosio.**

**Forma farmaceutica e contenuto:**

Pastiglie da succhiare, confezione originale con 30 pastiglie.

**Indicazioni d'uso:**

Trattamento di supporto per tosse, disturbi della gola e della faringe. Per proteggere e lenire la mucosa orale.

**Posologia:**

Adulti e bambini dai 6 anni in su: lasciare sciogliere 1-2 pastiglie in bocca più volte al giorno o succhiarle, secondo necessità. Non superare la dose massima giornaliera di 10 pastiglie.

**Istruzioni per l'uso:**

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Non usare le pastiglie per la tosse alla piantaggine se sei allergico o intollerante a uno qualsiasi dei loro ingredienti o se sospetti di esserlo.

Non utilizzare durante la gravidanza e l'allattamento. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni.

**Interazioni:**

Interazioni non note. Tuttavia, il prodotto non dovrebbe essere usato insieme ad altri dispositivi medici o prodotti di uso quotidiano nella cavità orale. Attendere almeno 30 minuti prima dell'assunzione.

**Avvertenze /indicazioni di sicurezza:**

In caso di reazioni di ipersensibilità a **Mivolis pastiglie per la tosse con piantaggine**, interrompere immediatamente l'utilizzo. Informare il proprio medico o un farmacista.

Il prodotto contiene maltitolo e sorbitolo. Consultare il medico prima dell'uso in caso di ipesensibilità nota a certi zuccheri. Consultare urgentemente un medico se non si nota un miglioramento dei sintomi entro 7 giorni o se si sospetta una patologia/infezione/lesione grave.

**Nota per i diabetici:**

Una pastiglia contiene 0,87 g di carboidrati.

**Effetti collaterali:**

- Molto raramente possono verificarsi disturbi gastrici o flatulenza.
- Se consumato in eccesso, può verificarsi un effetto lassativo a causa del contenuto di maltitolo e sorbitolo.

**Consigli per la conservazione:**

Conservare in luogo asciutto e a una temperatura non oltre i 25 °C

**Tenere fuori dalla portata dei bambini!**

Stato delle informazioni: 07/2020

☞ Orvostechikai eszköz

## Mivolis lándzsás útifű torokcukorka

Köhögés elleni pasztilla lándzsás útifűvel

Felhasználási útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el!

**Használati utasítás:**

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, mert fontos információkat tartalmaz arról, mire kell ügyelni ennek a gyógyászati segédeszköznek az alkalmazásakor.

Összetétel:

**Egy pasztilla tartalmaz:** lándzsás útifű sűrítmény-kivonatot (100 mg), arabmégzát (Acacia senegal), maltitol, sorbitolt, feketeibizli-aromát, erdei gyümölcs aromát, citromsavat, aszorbinsavat, közepes szénláncú triglicerideket, aceszulfám-K-t, vizet.

**Glutén- és laktózmentes. Vegán. Fruktózmentes.**

**Kiszerelés és tartalom:**

Szopogató pasztillák, eredeti csomagolásban 30 darab pasztilla.

**Alkalmazási területek:**

Köhögés, rekedtség és kaparó torok okozta panaszok enyhítésére, valamint a száj, a torok és a garat nyálkahártyájának gyulladásos megbetegedéseinek kiegészítő kezelésére.

**Adagolási útmutató, az alkalmazás módja és időtartama: Milyen gyakran és milyen mennyiségben ajánlott alkalmazni a lándzsás útifűt tartalmazó köhögés elleni pasztillát?**

Felnőttek és 6 évesnél idősebb gyermekek számára.

Az első panaszok (pl. kaparó torok, nyelési nehézség vagy köhögési inger) jelentkezésekor szükség szerint naponta többször 1–2 pasztillát lassan elszopogatni.

A napi legfeljebb 10 pasztilla adagot nem szabad túllépni.

A készítmény hosszabb időn át is biztonságosan alkalmazható.

**Figyelmeztetés:**

Amennyiben néhány napon belül a panaszok nem enyhülnek, forduljon orvoshoz.

**Figyelmeztetés cukorbetegeknek:**

Egy szopogató pasztilla 0,87 g szénhidrátot tartalmaz.

**Mellékhatások:**

Nagyon ritkán gyomorpanaszok vagy puffadás jelentkezhet. A maltitol- és sorbitoltartalom miatt túlzott fogyasztás esetén hashajtó hatás előfordulhat.

**Kölcsönhatások:**

Más szerekkel való kölcsönhatás nem ismert. Ennek ellenére a készítményt nem szabad közvetlenül más gyógyászati segédeszközökkel vagy mindennapi használatra szánt termékekkel együtt a szájüregben alkalmazni. Legalább 30 perces időközt kell betartani.

**Ellenjavallatok:**

Ismert túlérzékenység esetén a készítmény bármely összetevőjével szemben a lándzsás útifűt tartalmazó pasztilla nem alkalmazható.

Ez a gyógyászati segédeszköz maltitolt és sorbitolt tartalmaz. Csak orvosi konzultáció után alkalmazza, ha ismert Önnél bizonyos cukrokkal szembeni intolerancia.

**Mit kell figyelembe venni terhesség és szoptatás idején, valamint gyermekeknél?**

Mivel nem áll rendelkezésre elegendő vizsgálati adat, a lándzsás útifűt tartalmazó pasztilla terhesség és szoptatás idején nem alkalmazható. A készítmény 6 éves kor alatti gyermekek számára nem ajánlott.

**Óvintézkedések és különleges figyelmeztetések: Milyen óvintézkedéseket kell betartani?**

A sorbitol- és maltitoltartalom miatt túlzott fogyasztás esetén enyhe hashajtó hatás léphet fel.Ha a panaszok 7 napon belül nem enyhülnek, vagy súlyos betegség gyanúja merül fel, feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

Az információk kelte 2020. július

Dispozitiv medical

## Mivolis Pastile pentru tuse cu pătlagină îngustă

**Mivolis Pastile pentru tuse** cu pătlagină îngustă

**Instrucțiuni de utilizare:**

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, deoarece conțin informații importante privind utilizarea corectă a acestui dispozitiv medical.

Compoziție:

**O pastilă conține:** extract gros de pătlagină îngustă (100 mg), gumă arabică (Acacia senegal), maltitol, sorbitol, aromă de coacăze negre, aromă de fructe de pădure, acid citric, acid ascorbic, trigliceride cu lanț mediu, acesulfam K, apă.

**Fără gluten și lactoză. Vegan. Fără fructoză.**

**Formă farmaceutică și conținut:**

Pastile de supt, ambalaj original cu 30 de pastile.

**Indicații terapeutice:**

Pentru calmarea iritației în caz de tuse, răgușeală și gât iritat, precum și ca tratament adjuvant în inflamațiile mucoasei din cavitatea bucală, gât și faringe.

**Instrucțiuni de dozare, mod și durată de administrare:**

**Cât de des și în ce cantitate trebuie administrate pastilele pentru tuse cu pătlagină?**

Pentru adulți și copii peste 6 ani.

La primele semne de disconfort, cum ar fi gât iritat, dificultăți la înghițire sau tuse seacă, se recomandă să lăsați să se dizolve lent în gură 1–2 pastile de mai multe ori pe zi, după necesitate. Doza maximă zilnică de 10 pastile nu trebuie depășită.

Produsul poate fi utilizat fără probleme pe o perioadă mai lungă.

**Atenționare:**

Dacă simptomele nu se ameliorează după câteva zile, vă recomandăm să consultați un medic.

**Atenționare pentru diabetici:**

O pastilă de supt conține 0,87 g carbohidrați.

**Reacții adverse:**

Foarte rar pot apărea disconfort gastric sau balonare. Din cauza conținutului de maltitol și sorbitol, consumul excesiv poate avea efect laxativ.

**Interacțiuni:**

Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte produse. Totuși, produsul nu trebuie administrat concomitent în cavitatea bucală cu alte dispozitive medicale sau produse de uz cotidian. Trebuie respectat un interval de cel puțin 30 de minute.

**Contraindicații:**

În caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componente, pastilele pentru tuse cu pătlagină nu trebuie utilizate.

Acest dispozitiv medical conține maltitol și sorbitol. Administrați-l doar după consultarea medicului dacă știți că suferiți de intoleranță la anumii zaharuri.

**Ce trebuie avut în vedere în timpul sarcinii, alăptării și la copii?**

Deoarece nu există suficiente studii, pastilele pentru tuse cu pătlagină nu trebuie utilizate în timpul sarcinii și alăptării. Produsul nu este recomandat copiilor sub 6 ani.

**Precauții și atenționări speciale:**

**Ce precauții trebuie respectate?**

Din cauza conținutului de sorbitol/maltitol, utilizarea excesivă poate provoca un ușor efect laxativ. Dacă simptomele nu se ameliorează în termen de 7 zile sau dacă există suspiciunea unei afecțiuni grave, este absolut necesar să consultați un medic.

Data informațiilor: iulie 2020

Zdravotnický prostriedek

## Mivolis Pastilky proti kašli s jitrocelem kopinatým

**Návod k použití:**

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, protože obsahuje důležité informace o správném používání tohoto zdravotnického prostředku.

Složení:

**Jedna pastilka obsahuje:** hustý extrakt z jitrocele kopinatého (100 mg), arabskou gumu (Acacia senegal), maltitol, sorbitol, aroma černého rybízu, aroma lesních plodů, kyselinu citronovou, kyselinu askorbovou, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, acesulfam K, vodu.

**Bez lepku a laktózy. Veganské. Bez fruktózy.**

**Léková forma a obsah balení:**

Pastilky ke sání, původní balení s 30 pastilkami.

**Indikace k použití:**

Ke zmírnění podráždění při kašli, chrapotu a škrábání v krku, jakož i k podpůrné léčbě zánětů sliznice v ústní dutině, krku a hltanu.

**Dávkování, způsob a délka užívání:**

**Jak často a v jakém množství se mají pastilky s jitrocelem užívat?**

Pro dospělé a děti od 6 let.

Při prvních příznacích potíží, jako je například škrábání v krku, potíže s polykáním nebo dráždivý kašel, nechte podle potřeby pomalu rozpustit v ústech 1–2 pastilky několikrát denně. Maximální denní dávka 10 pastilek nesmí být překročena. Výrobek lze bezpečně užívat po delší dobu.

**Upozornění:**

Pokud se potíže během několika dní nezlepší, doporučujeme vyhledat lékaře.

**Upozornění pro diabetiky:**

Jedna pastilka obsahuje 0,87 g sacharidů.

**Nežádoucí účinky:**

Velmi zřídka se mohou objevit žaludeční potíže nebo nadýmání. Kvůli obsahu maltitolu a sorbitolu se při nadměrné konzumaci může objevit projímavý účinek.

**Interakce:**

Nebyly zjištěny žádné interakce s jinými přípravky. Přesto by se výrobek neměl používat současně v dutině ústní s jinými zdravotnickými prostředky nebo výrobky denní potřeby. Je třeba dodržet časový odstup alespoň 30 minut.

**Kontraindikace:**

Při známé přecitlivělosti na některou ze složek se pastilky proti kašli s jitrocelem nesmí používat.

Tento zdravotnický prostředek obsahuje maltitol a sorbitol. Užíjte jej pouze po konzultaci s lékařem, pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

**Co je třeba vzít v úvahu během těhotenství, kojení a u dětí?**

Protože nejsou k dispozici dostatečné studie, pastilky proti kašli s jitrocelem by se neměly užívat během těhotenství a kojení.

Pastilky s jitrocelem nejsou vhodné pro děti do 6 let.

**Opatření a zvláštní upozornění:**

**Jaká opatření je třeba dodržovat?**

Kvůli obsahu sorbitolu/maltitolu e při nadměrném užívání může objevit mírný projímavý účinek. Pokud během 7 dnů nedojde ke zlepšení potíží nebo existuje podezření na vážné onemocnění, je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.

Datum revize textu: červenec 2020

Wyrób medyczny

## Mivolis Pastylki na kaszel z babką lancetowatą

**Instrukcja użycia:**

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące prawidłowego stosowania tego wyrobu medycznego.

Skład:

**Jedna pastylka zawiera:** gęsty ekstrakt z babki lancetowatej (100 mg), gumę arabską (Acacia senegal), maltitol, sorbitol, aromat porzeczkowy, aromat leśnych owoców, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy, trójglicerydy o średniej długości łańcucha, acesulfam K, wodę.

**Bez glutenu i laktozy. Wegańskie. Bez fruktozy.**

**Postać farmaceutyczna i zawartość opakowania:**

Pastylki do ssania, oryginalne opakowanie zawiera 30 pastylek.

**Wskazania do stosowania:**

Do łagodzenia podrażnień przy kaszlu, chrypcie i podrażnionym gardle, a także jako środek wspomagający w leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, gardła i krtaeni.

**Dawkowanie, sposób i czas stosowania:**

**Jak często i w jakiej ilości należy stosować pastylki na kaszel z babką lancetowatą?**

Dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Przy pierwszych objawach dolegliwości, takich jak podrażnione gardło, trudności w polykaniu lub kaszel, należy ssać powoli 1–2 pastylki kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 10 pastylek i nie powinna być przekraczana.

Preparat może być stosowany przez dłuższy czas.

**Uwaga:**

Jeśli objawy nie ustąpią po kilku dniach, zaleca się konsultację lekarską.

**Informacja dla diabetyków:**

Jedna pastylka zawiera 0,87 g węglowodanów.

**Działania niepożądane:**

Bardzo rzadko mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe lub wzdęcia. Ze względu na zawartość maltitolu i sorbitolu, nadmierne spożycie może wywołać efekt przeczyszczający.

**Interakcje:**

Nie są znane interakcje z innymi preparatami. Jednakże wyrób nie powinien być stosowany równocześnie w jamie ustnej z innymi wyrobami medycznymi lub produktami codziennego użytku. Należy zachować odstęp co najmniej 30 minut.

**Przeciwwskazania:**

W przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, pastylki na kaszel z babką lancetowatą nie powinny być stosowane.

Wyrób medyczny zawiera maltitol i sorbitol. Należy stosować go wyłącznie po konsultacji z lekarzem, jeśli wiadomo, że występuje u Państwa nietolerancja niektórych cukrów.

**Co należy uwzględnić w czasie ciąży, karmienia piersią i u dzieci?**

Ze względu na brak wystarczających badań pastylki na kaszel z babką lancetowatą nie powinny być stosowane w okresie ciąży i karmienia piersią.

Pastylki nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 6 roku życia.

**Środki ostrożności i szczególne zalecenia:**

**Jakie środki ostrożności należy zachować?**

Ze względu na zawartość sorbitolu/maltitolu, nadmierne stosowanie może wywołać łagodne działanie przeczyszczające.

Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpi poprawa dolegliwości lub istnieje podejrzenie poważniejszej choroby, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Data opracowania ulotki: lipiec 2020

Zdravotnícka pomôcka

## Mivolis pastilky so skorocelom kopijovitým

**Návod na použitie:**

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie o správnom používaní tejto zdravotníckej pomôcky.

Zloženie:

**Jedna pastilka obsahuje:** 100 mg zahusteného extraktu zo skorocelu kopijovitého (*Plantago lanceolata*), arabskej gummy (*Acacia senegal*), maltitol, sorbitol, arómu čiernych ríbeží, arómu lesných plodov, kyselinu citrónovú, kyselinu askorbovú, triglyceridy so stredne dlhým refazcom, acesulfám K, vodu.

**Bez gluténu a laktózy. Vegánsky výrobok. Bez fruktózy.**

**Aplikačná forma a obsah balenia:**

Pastilky na cmúľanie, originálne balenie s 30 pastilkami.

**Účel určenia:**

Na zmiernenie podráždenia pri kašli, zachrípnutí a škrabani v hrdle, ako aj na podpurnú liečbu zápalu sliznic ústnej dutiny, hrdla a hltanu.

**Dávkovanie, spôsob a dĺžka užívania:**

**Ako často a v akom množstve sa majú pastilky so skorocelom kopijovitým používať?**

Pre dospelých a deti od 6 rokov.

Pri prvých príznakoch ťažkostí, ako je napríklad škrabanie v hrdle, ťažkosti s prehĺtaním alebo dráždivý kašeľ, nechajte podľa potreby niekoľkokrát denne pomaly rozpustiť v ústach 1–2 pastilky.

Maximálna denná dávka 10 pastilek sa nesmie prekročiť.

Výrobek je možné používať dlhodobo.

**Upozornenie:**

Ak sa ťažkosti počas niekoľkých dní nezlepšia, odporúčame vyhľadať lekára.

**Upozornenie pre diabetikov:**

Jedna pastilka obsahuje 0,87 g sacharidov.

**Vedľajšie účinky:**

Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti alebo nadúvanie.

Kvůli obsahu maltitolu a sorbitolu môže nadmerná konzumácia vyvolať laxatívny účinok.

**Interakcie:**

Nie sú známe žiadne interakcie s inými prípravkami. Napriek tomu by sa výrobok nemal používať súčasne v ústnej dutine s inými zdravotnickými pomôckami alebo výrobkami dennej spotreby. Je potrebné dodržať časový odstup aspoň 30 minút.

**Kontraindikácie:**

Pri známej precitliveneosti na niektorú zo zložiek sa pastilky so skorocelom kopijovitým nesmú používať.

Táto zdravotnícka pomôcka obsahuje maltitol a sorbitol. Ak je vám známe, že trpíte neznášanlivosťou niektorých druhov cukrov, užívajte pastilky so skorocelom kopijovitým len po porade so svojim lekárom.

**Čo je potrebné vziať do úvahy počas tehotenstva, dojčenia a u detí?**

Keďže neexistuje dostatok štúdií, nemali by sa pastilky so skorocelom kopijovitým užívať počas tehotenstva a dojčenia. Pastilky so skorocelom kopijovitým nie sú vhodné pre deti mladšie ako 6 rokov.

**Preventívne opatrenia a osobitné upozornenia:**

**Áké preventívne opatrenia je potrebné dodržiavať?**

Kvůli obsahu sorbitolu/maltitolu sa pri nadmernom užívaní môže objaviť mierny laxatívny účinok. Ak sa ťažkosti nezlepšia do 7 dní alebo existuje podozrenie na závažné ochorenie, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Stav informácie: júl 2020

Vertrieb durch/Verpackungserzeuger: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
www.dm.de

Vertrieb in Österreich: dm drogerie markt
AT-5071 Wals
www.dm.at

Euro Vital Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 47
DE-22453 Hamburg



22250-05

60014920-250-04a