



Medizinprodukt

Reizhusten Lutschpastillen

mit Manuka-Honig
Bei Reizhusten, Halsschmerz und Heiserkeit

Zusammensetzung: Isländisch Moos-Extrakt, Malvenextrakt, Vitamin C, Saccharose, Menthol, Glukose-Fruktosesirup, Kirscharoma, Manuka-Honig.

Anwendungsgebiet: Mivolis Reizhusten Lutschpastillen werden zur physikalischen Therapie von Reizhusten, Halsschmerzen und Heiserkeit (z. B. bei Erkältungen) angewendet sowie zur Unterstützung der natürlichen Befeuchtung der Mund- und Rachenschleimhaut.

Anwendungshinweise: Mivolis Reizhusten Lutschpastillen können je nach Bedarf mehrmals täglich im Abstand von einer Stunde angewendet werden. Die Tagesdosis von 6 Lutschpastillen sollte nicht überschritten werden. Bei Kindern (6–16 Jahre) sollte die Tagesdosis von max. 3 Lutschpastillen nicht überschritten werden. Falls nach 7 Tagen keine Besserung eingetreten ist, sollte der Rat eines Arztes oder Apothekers eingeholt werden.

Wann dürfen Mivolis Reizhusten Lutschpastillen nicht angewendet werden? Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen das Präparat oder eines seiner Bestandteile oder einem Verdacht dürfen Mivolis Reizhusten Lutschpastillen nicht angewendet werden. Bei entsprechend sensibilisierten Personen können durch Menthol Überempfindlichkeitsreaktionen ausgelöst werden. Personen mit Allergien gegen Bienen(-produkte) oder Bienenstiche sollten das Produkt nicht verwenden. Es liegen keine Untersuchungen zur Anwendung während der Schwangerschaft vor, weshalb Reizhusten Lutschpastillen erst nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden sollten. Bei Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern/Zuckeraustauschstoffen nehmen Sie Mivolis Reizhusten Lutschpastillen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein.

Können Mivolis Reizhusten Lutschpastillen mit anderen Mitteln verwendet werden? Eine Beeinflussung der Wirksamkeit anderer Arzneimittel ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Mivolis Reizhusten Lutschpastillen nicht bekannt. Dennoch sollen Mivolis Reizhusten Lutschpastillen nicht unmittelbar mit anderen Medikamenten oder Produkten des täglichen Bedarfs zusammen eingenommen werden. Auf einen ausreichenden Zeitabstand (mind. 30 Minuten) zwischen den jeweiligen Anwendungen ist zu achten.

Welche unerwünschten Nebenwirkungen können Mivolis Reizhusten Lutschpastillen haben? Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erwarten.

Verfallsdatum und Haltbarkeit: Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen Mivolis Reizhusten Lutschpastillen nicht mehr verwendet werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information: Mai 2021

(IT) Pastiglie per la tosse secca con miele di Manuka
In caso di tosse secca, mal di gola e raucedine
Dispositivo medico

Composizione: Estratto di muschio islandese, estratto di malva, vitamina C, saccarosio, mentolo, sciroppo di glucosio-fruttosio, aroma di ciliegie, miele di Manuka.

Campo di applicazione: Le pastiglie per la tosse secca Mivolis vengono usate per il trattamento di tosse secca, mal di gola e raucedine (per es. in caso di raffreddore) nonché per il supporto dell'umidificazione naturale della mucosa della bocca e della faringe.

(DE) Gebrauchsinformation: bitte aufmerksam lesen

(IT) Indicazioni per l'uso: leggere attentamente il foglietto illustrativo.

(PL) Instrukcja użytkownika: proszę przeczytać uważnie

(CZ) Návod k použití: pečlivě si jej přečtěte

(SI) Navodila za uporabo: skrbno preberite

Indicazioni per l'uso: Le pastiglie per la tosse secca Mivolis possono essere assunte in caso di necessità più volte al giorno a distanza di un'ora. La dose giornaliera di 6 pastiglie non deve essere superata. Nei bambini (6–16 anni) non si deve superare la dose massima giornaliera di 3 pastiglie. Qualora non si noti un miglioramento dopo 7 giorni, si consiglia di consultare un medico o un farmacista.

Quando non devono essere assunte le pastiglie per la tosse secca Mivolis? In presenza di un'intolleranza accertata o sospetta al preparato o a uno dei componenti, non si devono assumere le pastiglie per la tosse secca Mivolis. Nelle persone sensibilizzate il mentolo può provocare reazioni allergiche. Le persone con allergie alle api e ai prodotti delle api o alle punture delle api non devono assumere il prodotto. Non sono presenti studi sulla somministrazione durante la gravidanza, pertanto si raccomanda di assumere le pastiglie per la tosse secca solo dietro consultazione del medico. In presenza di un'intolleranza a determinati zuccheri/sostituti dello zucchero, si raccomanda di assumere le pastiglie per la tosse secca Mivolis solo dietro consultazione del medico o del farmacista.

Le pastiglie per la tosse secca Mivolis possono essere assunte insieme ad altri farmaci? Non sono note interazioni con altri farmaci, se le pastiglie per la tosse secca Mivolis vengono assunte correttamente. Tuttavia, si sconsiglia di assumere le pastiglie per la tosse secca Mivolis direttamente insieme ad altri farmaci o prodotti di uso quotidiano. Occorre rispettare una distanza sufficiente (minimo 30 minuti) tra le rispettive somministrazioni.

Quali effetti indesiderati possono presentare le pastiglie per la tosse secca Mivolis? Se le pastiglie vengono assunte correttamente, non sono previsti effetti indesiderati.

Data di scadenza e durata: Dopo la data di scadenza le pastiglie per la tosse secca Mivolis non devono più essere usate.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Stato dell'informazione: maggio 2021

(PL) Wyrób medyczny

Pastyłki do ssania na drażniący kaszel z miodem Manuka
Na drażniący kaszel, ból gardła i chrypkę

Skład: wyciąg z mchu islandzkiego, wyciąg z malwy, witamina C, sacharoza, mentol, syrop glukozowo-fruktozowy, aromat wiśniowy, miód manuka.

Zakres zastosowania: Pastyłki do ssania Mivolis na drażniący kaszel stosuje się w fizykoterapii drażniącego kaszlu, bólu gardła i chrypki (np. przy przeziębieniach) oraz w celu wspomagania naturalnego nawilżania błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie i sposób użycia: Pastyłki do ssania Mivolis na drażniący kaszel można w zależności od potrzeb stosować kilka razy dziennie w odstępach godzinnych. Nie należy przekraczać dziennej dawki wynoszącej 6 pastylek do ssania. W przypadku dzieci (6–16 lat) nie należy przekraczać dziennej dawki wynoszącej maksymalnie 3 pastylki do ssania. Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpi poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Kiedy nie należy stosować pastylek do ssania Mivolis na drażniący kaszel? Pastylek do ssania Mivolis na drażniący kaszel nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na preparat lub jeden z jego składników lub w przypadku podejrzenia takiej nadwrażliwości. U osób uczulonych mentol może spowodować reakcje nadwrażliwości. Osoby z alergią na pszczoły (produkty pszczele) lub użądlenie pszczoły nie powinny stosować produktu. Brak jest badań dotyczących stosowania wyrobu w czasie ciąży, dlatego pastylki do ssania na drażniący kaszel należy przyjmować tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku nietolerancji niektórych cukrów/zamienników cukru nie należy stosować tabletek do ssania Mivolis na drażniący kaszel do czasu konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Czy można stosować tabletki do ssania Mivolis na drażniący kaszel z innymi lekami? Nie jest znany wpływ na skuteczność innych leków przy zgodnym z przeznaczeniem stosowaniu tabletek do ssania Mivolis na drażniący kaszel. Jednakże tabletki do ssania Mivolis na drażniący kaszel nie należy przyjmować bezpośrednio z innymi lekami lub produktami codziennego użytku. Zwrócić uwagę na wystarczający odstęp czasu (minimum 30 minut) między przyjmowaniem poszczególnych produktów.

Jakie są możliwe skutki uboczne stosowania pastylek do ssania Mivolis na drażniący kaszel? Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami nie należy spodziewać się niepożądanych skutków ubocznych.

Data ważności i termin przydatności do spożycia: Nie stosować pastylek do ssania Mivolis na drażniący kaszel po upływie terminu ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2021

Ⓢ Pastilky proti dráždivému kašli s manukovým medem
Pri dráždivém kašli, bolestech v krku a chrapotu
Zdravotnický prostředek

Složení: Extrakt z islandského mechu, extrakt ze slézu, vitamin C, sacharóza, mentol, glukózo-fruktózový sirup, třešňové aroma, manukový med.

Oblast použití: Pastilky proti dráždivému kašli Mivolis se používají k fyzikální terapii dráždivého kašle, bolesti v krku a chrapotu (např. při nachlazení) a dále k podpoře přirozeného zvlhčení sliznice úst a krku.

Návod k použití: Pastilky proti dráždivému kašli Mivolis lze používat několikrát denně - podle potřeby každou hodinu. Denní dávka 6 pastilek by neměla být překročena. U dětí (6–16 let) by neměla být překročena denní dávka max. 3 pastilky. Pokud po 7 dnech nedojde ke zlepšení, je třeba vyhledat lékaře nebo lékárníka.

Kdy by se pastilky proti dráždivému kašli Mivolis neměly používat? Při známé přecitlivělosti na přípravek či některou z jeho složek nebo při podezření na ni se pastilky proti dráždivému kašli Mivolis nesmějí používat. U sensibilizovaných osob může mentol vyvolat reakce přecitlivělosti. Osoby s alergií na včely (včelí produkty) nebo včelí bodnutí by přípravek neměly používat. Nejsou k dispozici studie o užívání během těhotenství, a proto by se pastilky proti dráždivému kašli měly užívat pouze po konzultaci s lékařem. Pokud trpíte nesnášlivostí některých cukrů/náhražek cukrů, neužívejte pastilky proti dráždivému kašli Mivolis, dokud se neporadíte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mohou být pastilky proti dráždivému kašli Mivolis používány spolu s jinými léky? Vliv na účinnost jiných léčivých přípravků při použití pastilek na dráždivý kašel Mivolis není známý. Přesto by se pastilky proti dráždivému kašli Mivolis neměly přímo užívat s jinými léky nebo produkty denní potřeby. Dbejte na to, aby mezi jednotlivými aplikacemi uplynul dostatečný časový odstup (alespoň 30 min.).

Jaké jsou možné nežádoucí účinky pastilek proti dráždivému kašli Mivolis? Pokud se pastilky používají podle pokynů, nenastanou nežádoucí vedlejší účinky.

Datum spotřeby a trvanlivost: Po datu spotřeby pastilky proti dráždivému kašli Mivolis již neužívejte.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Stav informací: květen 2021

Ⓢ Pastile proti dražečemu kašlju z manuka medom
Pri dražečem kašlju, bolečinah v grlu in hripavosti
Medicinski pripomoček

Sestavine: izvleček islandskega lišaja, izvleček slezenovca, vitamin C, sahara, mentol, glukozni-fruktozni sirup, aroma češnje, manuka med.

Področje uporabe: Mivolis pastile proti dražečemu kašlju so namenjene za fizikalno terapijo dražečega kašlja, bolečin v grlu, kašlja in hripavosti (npr. pri prehladih) ter podpirajo naravno vlaženje ustne sluznice in sluznice žrela.

Napotki za uporabo: Mivolis pastile proti dražečemu kašlju lahko po potrebi uporabljate večkrat dnevno (na eno uro). Ne prekoračite dnevnega odmerka 6 pastil. Pri otrocih (6–16 let) ne smete preseči največjega dnevnega odmerka 3 pastil. Če po 7 dneh ne nastopi izboljšanje, se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.

Kdaj Mivolis pastil proti dražečemu kašlju ne smete uporabljati? Mivolis pastil proti dražečemu kašlju ne smete uporabljati ob znani preobčutljivosti ali sumu na preobčutljivost na pripravek ali katero izmed njegovih sestavin. Pri osebah s preobčutljivostjo lahko mentol sproži preobčutljivostno reakcijo. Osebe z alergijo na čebele, čebelje izdelke ali pike čebel, izdelke ne smejo uporabljati. O uporabi med nosenostjo raziskave niso na voljo, zato pastile proti dražečemu kašlju jemljite šele po posvetu z zdravnikom. Mivolis pastile proti dražečemu kašlju jemljite šele po posvetu z zdravnikom ali farmaceutom, če vam je znano, da ne prenašate določene vrste sladkorja/sladkorne nadomestka.

Ali smete Mivolis pastile proti dražečemu kašlju jemati skupaj z drugimi pripravki? Ob namenski uporabi Mivolis pastil proti dražečemu kašlju niso znani vplivi na učinkovitost drugih zdravil. Kljub temu Mivolis pastil proti dražečemu kašlju ne jemljite neposredno skupaj z drugimi zdravili ali izdelki za vsakodnevno uporabo. Med uporabo naj preteče dovolj časa (najmanj 30 minut).

Kakšne neželene stranske učinke lahko imajo Mivolis pastile proti dražečemu kašlju? Ob namenski uporabi ni pričakovati stranskih učinkov.

Datum uporabnosti in rok trajanja: Po preteku datuma uporabnosti Mivolis pastil proti dražečemu kašlju ne smete več uporabljati.

Hraniti nedostopno otrokom.

Stanje informacij: maj 2021

