



**aktiv**

**Bestandteile:** gereinigtes Wasser, EDTA, Karayagummi, Natriummethylparaben, Zuckerester von Speisefettsäuren, Aromen, Zitronensäure, Natriumbenzoat, Sucralose.

### 3. Verpackungsgröße

Die Verpackung enthält 10 Sticks mit je 15 g.

### 4. Anwendungshinweise

**Erwachsene:** 1 Stick dreimal täglich

**Kinder 6–12 Jahre:** 1 Stick zwei- bis dreimal täglich

Jeder Stick kann nach dem Öffnen nur einmal verwendet werden.

Gut schütteln, um den Inhalt des Sticks zu homogenisieren und vor dem Öffnen zu verteilen. Das Produkt kann sofort eingenommen oder in einem Glas Wasser oder anderen Flüssigkeiten (Saft, Joghurt) eingerührt werden.

Sobald der Stick geöffnet wurde, muss das Produkt in einer Anwendung eingenommen werden. Reste der Suspension können nicht später im Laufe des Tages eingenommen werden.

Es wird empfohlen, **Doppelherz aktiv Bei Durchfall** zwischen den Mahlzeiten einzunehmen. Um eine Dehydrierung zu verhindern, sollte zur Behandlung von akutem Durchfall frühzeitig eine Rehydrationslösung eingenommen werden.

### 5. Bekannte Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen in Zusammenhang mit der langfristigen Einnahme des Produktes bekannt. Bei einer Überdosis kann Verstopfung auftreten. Wenden Sie sich beim Auftreten von Nebenwirkungen, die nicht hier aufgeführt sind, an Ihren Arzt.

### 6. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Den Stick vor der Anwendung gut schütteln.
- Nicht länger als 10 aufeinanderfolgende Tage verwenden. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen.
- Wenn der Durchfall länger als 3 Tage anhält, wenden Sie sich an einen Arzt.
- Das Medizinprodukt nicht im Liegen einnehmen.
- Das Produkt nicht nach dem Verfallsdatum auf der Verpackung und dem Stick verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

# Bei Durchfall

✓ lactosefrei  
✓ glutenfrei

## 1. Bestimmung, Zusammensetzung und Indikation des Medizinproduktes

### 1.1 Beschreibung und Anwendungshinweise

**Doppelherz aktiv Bei Durchfall** ist ein flüssiges Medizinprodukt in einem Stick zur Behandlung von akutem und chronischem Durchfall sowie begleitenden Magen-Darm-Beschwerden.

### 1.2 Wirkmechanismus

Diosmektit ist natürliche Tonerde, die eine Struktur aus leicht überlappenden, kristallinen Lamellen aufweist, was eine hohe Absorptionsfähigkeit ermöglicht und somit die im Darmraum vorliegenden Flüssigkeiten (zusätzlich zu bakteriellen Toxinen und Viren, falls vorhanden) aufnehmen, die Stuhlkonsistenz erhöhen und die Ausscheidung verlangsamen kann. Durch die Absorptionsfähigkeit von Diosmektit kann **Doppelherz aktiv Bei Durchfall** mit den Glykoproteinen in der Schleimhaut interagieren, die die gastro-duodenale Wand auskleidet, und so deren physikalischen Eigenschaften ändern, um ein schützendes Gel gegen saure Hypersekretion und gastroschädigende Substanzen zu bilden, um eine Barrierewirkung gegen Entzündungsmechanismen zu erzeugen.

## 2. Zusammensetzung

Ein Stick **Doppelherz aktiv Bei Durchfall** enthält:

**Wirkstoff:** Diosmektit (1,5 g)

- Jeder Stick ist für den Einmalgebrauch bestimmt und sollte erst kurz vor der Einnahme geöffnet werden: Verwenden Sie zum Teil aufgebrauchte Sticks nicht wieder, da dies Risiken wie eine unwirksame Suspension oder Kontaminierung von **Doppelherz aktiv Bei Durchfall** nach sich ziehen kann.

- Die empfohlene Dosis darf nicht überschritten werden. Stellen Sie bei Nebenwirkungen (Verstopfung, Unterleibsschmerzen und Blähungen) die Anwendung ein und suchen Sie Ihren Arzt auf.

- Wenden Sie sich beim Auftreten von unerwarteten Nebenwirkungen, die nicht hier aufgeführt sind, an einen Arzt.

- Nicht bei Magen- oder Darmläsionen oder bei chronischer Verstopfung, Darmreizung oder Darmverschluss anwenden.

- Das Medizinprodukt enthält Aluminium durch Diosmektit: Wenn Sie andere Produkte oder Medikamente einnehmen, die Diosmektit, Tonerde oder Aluminiumverbindungen enthalten, wenden Sie sich vor der Einnahme von **Doppelherz aktiv Bei Durchfall** an Ihren Arzt.

- Verwenden Sie das Medizinprodukt nicht, wenn Sie andere Produkte oder orale Medikamente einnehmen: Die adsorbierende Wirkung von Diosmektit kann ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. Wenden Sie sich bei begleitenden medikamentösen Therapien vor der Einnahme von **Doppelherz aktiv Bei Durchfall** an Ihren Arzt.


## 7. Kontraindikationen und Anwendungsbeschränkung

Das Produkt nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden.

Nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe des Medizinproduktes anwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht im Falle einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit.

## 8. Aufbewahrung

**Doppelherz aktiv Bei Durchfall** sollte nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.

 Bewahren Sie **Doppelherz aktiv Bei Durchfall** bei Raumtemperatur (15–25 °C) auf; vermeiden Sie direkte Lichtquellen, Wärme und übermäßige Luftfeuchtigkeit. Das Verfallsdatum auf der Verpackung bezieht sich auf **Doppelherz aktiv Bei Durchfall** in ungeöffneter Verpackung und bei richtiger Aufbewahrung.

## 9. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften. **Doppelherz aktiv Bei Durchfall** oder die Verpackung auf keinen Fall in der Umwelt entsorgen.



SIIT S.r.l.

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) – Italien

## Vertrieb:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG  
Schleswiger Straße 74  
24941 Flensburg

CE 0426  
MEDIZINPRODUKT



Letzte Überarbeitung: 03/2022



**Queisser**  
PHARMA

Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg  
DEUTSCHLAND  
www.doppelherz.de