

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-007855_2		
Preparat/ Product:	Starazolin Podrażnione Oczy 10 ml /COC Farmaceutici/		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 130 x 180 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt Tekst/ Text: Times New Roman 7 pt		
Kolorystyka/ Colours:	 BLACK	Opracował/ Prepared by:	03.10.2023 M.Małodzińska

Starazolin® Podrażnione Oczy

Starazolin Podrażnione Oczy to sterylny roztwór okulistyczny o fizjologicznym pH, na bazie hialuronianu sodu, zawierający chlorek benzalkoniowy jako substancję konserwującą. Wyrób medyczny przede wszystkim nawilża powierzchnię oka i tworzy na niej warstwę ochronną dzięki zawartości hialuronianu sodu.

Starazolin Podrażnione Oczy zapewnia uczucie nawilżonych i odświeżonych oczu.

Starazolin Podrażnione Oczy jest wskazany do zwalczania objawów zespołu suchego oka.

Łagodzi zaczerwienienie, podrażnienie i zmęczenie oczu.

Formuła zawiera również chlorek sodu i bufor fosforanowy gwarantujący fizjologiczne właściwości roztworu oraz wyciągi wodne z rumianku i chabra, aby zapewnić działanie nawilżające.

ZASTOSOWANIE

Kropki do oczu **Starazolin Podrażnione Oczy** są wskazane do stosowania w celu zapobiegania objawom zespołu suchego oka i łagodzenia podrażnień, zaczerwienienia i zmęczenia oczu wywołanych czynnikami środowiskowymi (klimatyzacja, nadmierne promieniowanie słoneczne, wiatr, dym, zanieczyszczenie, woda morska lub woda w basenie), nośnieniem soczewek kontaktowych, długą jazdą samochodem czy długotrwałym korzystaniem z komputera.

SKŁAD

Hialuronian sodu 0,1%, wyciąg wodny z chabra; wyciąg wodny z rumianku; fosforan sodu dwuzasadowy siedmiowodny; fosforan sodu jednozasadowy dwuwodny; Polisorbat 80; chlorek benzalkoniowy; chlorek sodu; woda do wstrzykiwań.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem dokładnie umyć i osuszyć ręce.
- Przed pierwszym użyciem mocno chwycić zakrętkę ochronną i odkręcić ją w celu przerwania pierścienia zabezpieczającego.
- Otworzyć butelkę, obracając zakrętkę ochronną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Zdjąć zakrętkę ochronną.
- Odwrócić butelkę do góry dnem i delikatnie nacisnąć pojemnik, aby wkroplić 2 lub 3 krople do oka.
- Po użyciu zamknąć pojemnik, przekręcając zakrętkę ochronną zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, nie stosować w przypadku chorób oczu (np. jaskra, dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera).
- Produkt jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i starszych. W przypadku stosowania u dzieci zaleca się konsultację z lekarzem.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się z lekarza przed zastosowaniem tego produktu.
- Nie stosować kropli do oczu dłużej niż 28 dni po pierwszym otwarciu butelki. Wyrzucić po 28 dniach od otwarcia, nawet jeśli w butelce pozostał roztwór.
- Produktu nie należy stosować częściej niż 3 razy na dobę.
- Przed zastosowaniem produktu należy zdjąć soczewki kontaktowe. Można je ponownie założyć po odczekaniu co najmniej 15 minut.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania do oczu.
- Może być używany tylko przez jednego pacjenta.
- Nie należy używać produktu, jeśli pierścień zabezpieczający na zakrętkę butelki jest naruszony.



- Nie należy używać produktu, jeśli widoczne są w nim cząstki i (lub) zmiana zabarwienia ^{ULT-007855_2} roztworu.
- Podczas stosowania produktu nie dotykać oka ani żadnej innej powierzchni końcówek zakraplacza.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub wydrukowanego na butelce.
- Nie stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować produktu w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny astrowatych (*Asteraceae*).
- Jeśli u pacjenta występuje ciężkie uszkodzenie przezroczystej warstwy przedniej oka (rogówki), fosforany w bardzo rzadkich przypadkach mogą spowodować pojawienie się złamanych plam na rogówce w wyniku odkładania się wapnia w trakcie leczenia.
- Nie zgłaszano interakcji z innymi lekami ani innymi kroplami do oczu, jednak należy zachować odstęp co najmniej 15 minut pomiędzy podaniem innych kropli do oczu.
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania produktu należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- Produkt należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego, nie połykać.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do Producenta i do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
www.urpl.gov.pl

DIAGNOSTYKA

Dotychczas nie są znane żadne działania niepożądane.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C).


Zawartość należy zużyć w ciągu 28 dni po pierwszym otwarciu.

OPAKOWANIE

Butelka 10 ml.

TERMIN WAŻNOŚCI

Sprawdzić termin ważności podany na kartoniku. Podany termin ważności odnosi się do produktu w nienaruszonym opakowaniu.



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15
40019 - Sant'Agata Bolognese (BO)
Włochy



ZF Polpharma S.A.
ul. Półpińska 19
83-200 Starogard Gdański
Polska

Data ostatniej aktualizacji: 01.01 z 02/2023

