

wyrób medyczny

Tabletki Emskie z Wadowic

Tabletki do ssania o smaku miętowym

Instrukcja używania

1. Opis produktu

2. Skład

3. Opis działania

4. Przewidziane zastosowanie

5. Sposób używania

6. Przeciwwskazania i ostrzeżenia

7. Przechowywanie

8. Opakowanie

9. Zgłaszanie poważnego incydentu

10. Producent

1. Opis produktu

Tabletki Emskie z Wadowic zawierają substytut soli emskiej o podobnej ilości podstawowych kationów i anionów oraz równoważnym odczynie pH.

2. Skład

Wodorowęglan sodu, chlorek sodu, wodorowęglan potasu, siarczan magnezu, fosforan dwupotasowy, pozostałe składniki: sorbitol, ksylitol, aromat naturalny, poliwinylpirolidon, maltodekstryna, sacharynian sodu.

3. Opis działania

Tabletki Emskie z Wadowic do ssania zapewniają wydłużony kontakt soli o lekko alkalicznym odczynie z błoną śluzową jamy ustnej i gardła. Sól emska alkalizuje i rozrzedza wydzielinę. Miejscewa podwyższona koncentracja kationów i anionów powoduje transport wody na zasadzie zjawiska osmozy. Mechanizmy te pobudzają wydzielanie śluzu i ułatwiają odkrztuszenie, co łagodzi kaszel i chrypkę. Tabletki Emskie z Wadowic przywracają równowagę pH w jamie ustnej.

4. Przewidziane zastosowanie

Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz ułatwienie odkrztuszenia. Podwyższenie odczynu pH w jamie ustnej. Wyrób może być używany również przez osoby pracujące głosem, a także w zapyłonych lub suchych, ogrzewanych pomieszczeniach.

5. Sposób używania

Osoby dorosłe i dzieci od 6 roku życia: ssać powoli 1 tabletkę 3–5 razy dziennie.

Wyrób można stosować przez 3 tygodnie.

6. Przeciwwskazania i ostrzeżenia

W trakcie przyjmowania wyrobu należy zwracać uwagę na ilość przyjmowanej soli kuchennej i ograniczyć ilość spożywanej soli.

Stosować ostrożnie u osób przestrzegających diety niskosodowej.

Zawartość sodu w 1 tabletkie: 45 mg.

Nie stosować wraz z innymi preparatami do ssania. Wyrób może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego w postaci podrażnienia błony śluzowej żołądka, zgagi, wzdęć.

Nie stosować u pacjentów z gruźlicą, krztuścem, zapaleniem oskrzeli.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Termin ważności umieszczony jest na kartoniku oraz blistrze.

Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie.

Stosować zgodnie z instrukcją używania.

7. Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze 5–25°C, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

8. Opakowanie

Opakowanie zawiera 12 tabletek.


9. Zgłaszanie poważnego incydentu

Jeżeli wystąpi poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy powiadomić o tym producenta, ewentualnie lekarza lub farmaceutę. Poważny incydent można zgłosić bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel. +48 22 492 11 00, e-mail: urpl@urpl.gov.pl

10. Producent

 "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polska
e-mail: gpsrpld@polskilek.pl
tel. +48 33 870 83 01

Data aktualizacji instrukcji: 25.08.2025



0ULO156TSEMNPATL01


 Wyrób medyczny

 Termin ważności


 Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją używania

 Producent

 Numer serii

 Znak zgodności CE

 5°C–25°C
Ograniczenia dopuszczalnej temperatury przechowywania

 Unikalny identyfikator wyrobu medycznego