



Lippen-Herpes-Creme

6 ml



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Anwendung der Doppelherz med Lippen-Herpes-Creme, auch wenn Sie dieses Produkt bereits zuvor verwendet haben. Möglicherweise wurden die Informationen seit der letzten Anwendung von Doppelherz med Lippen-Herpes-Creme aktualisiert. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Creme zur Anwendung in allen 4 Phasen eines Lippen-Herpes. Doppelherz med Lippen-Herpes-Creme ist ein einzigartiges Produkt mit nachgewiesener Wirksamkeit in allen 4 Phasen eines Lippen-Herpes.

Doppelherz med Lippen-Herpes-Creme bildet eine schützende Feuchtigkeitsbarriere, um die Lippen mit Feuchtigkeit zu versorgen sowie vor Umwelteinflüssen zu schützen und lindert das Kribbeln (Juckreiz), reduziert die Bläschenbildung, verkürzt die Heilungsdauer und verhindert das Aufreißen der Herpes-Kruste. Doppelherz med Lippen-Herpes-Creme enthält einen Lichtschutzfaktor (LSF 30) und ist transparent, sodass die Lippenbläschen nicht betont werden.

Was bewirkt Doppelherz med Lippen-Herpes-Creme in den einzelnen Phasen eines Lippen-Herpes?

- 0. **Inaktiver Herpes-Virus**
Blockiert die Auslöser von Lippen-Herpes und verbessert den Zustand der Lippen
- 1. **Phase 1: Kribbeln**
Lindert das Kribbeln
- 2. **Phase 2: Bläschenbildung**
Reduziert die Bläschenbildung
- 3. **Phase 3: Aufplatzen und Krustenbildung**
Verkürzt die Heilungsdauer
- 4. **Phase 4: Heilung**
Verhindert das Aufreißen der Herpes-Kruste

Auslöser von Lippen-Herpes:

- Infektionen
- Stress
- Müdigkeit
- Extreme Kälte
- Sonnenlicht / UV-Strahlung
- Hormonelle Veränderungen
- Lippen-Trauma
- Geschwächtes Abwehrsystem

Inhaltsstoffe:

Isostearyl isostearate (46%), jojoba oil (12%), hydrogenated styrene/isoprene copolymer, ethylhexyl methoxycinnamate (8%), PEG-8 beeswax, octocrylene (6%), diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (3%), zinc oxide (2.2%), zinc ricinoleate, aluminum starch octenylsuccinate, sucrose tetrastearate triacetate, parfum, tocopheryl acetate, butyrospermum parkii (shea) butter, hydrogenated styrene/butadiene copolymer, cera microcristallina, pomegranate oil, triethoxycaprylylsilane.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

- Lippen-Herpes ist sehr ansteckend. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in Kontakt mit Säuglingen oder Kleinkindern kommen.
- Verwenden Sie die Creme nur für sich selbst, um eine Ansteckung anderer Personen zu vermeiden.
- Nur für die äußerliche Anwendung auf und um die Lippen geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe allergisch oder überempfindlich sind. Im Fall einer Reizung oder allergischen Reaktion beenden Sie sofort die Anwendung. Sollten die Symptome bestehen bleiben, kontaktieren Sie eine Ärztin oder einen Arzt.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, verwenden Sie das Produkt nur auf ärztliche Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht.
- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren.
- Falls nach 2 Wochen keine Besserung eingetreten ist, kontaktieren Sie eine Ärztin oder einen Arzt und beenden Sie die Anwendung des Produktes.

Dosierung und Anwendung:

Für ein optimales Behandlungsergebnis und um eine Ausbreitung des Lippen-Herpes zu verhindern, tragen Sie die Creme 3- bis 6-mal am Tag auf die betroffenen Bereiche der Lippen auf. Die Doppelherz-Lippen-Herpes-Creme kann bedenkenlos während des gesamten Auftretens des Lippen-Herpes angewendet werden – vom ersten Kribbeln bis zum Ablösen der Herpes-Kruste und der vollständigen Abheilung des Lippen-Herpes. Es wird geraten, vor und nach der Anwendung der Creme die Hände zu waschen, um eine Kontamination zu vermeiden. Wenn Sie Lippenstift benutzen möchten, tragen Sie bitte 15 Minuten vorher Doppelherz med Lippen-Herpes-Creme auf.

Die Creme ist frei von Sulfaten, Polyethylenglykolen, Triethanolaminen, Diethanolaminen, Parabenen und anderen Konservierungsstoffen.

Hinweis:

Um eine optimale Anwendung des Produktes zu gewährleisten, ist die Tube größer als der Inhalt. Die Tube enthält 6 ml der Creme. Wenn Sie die Creme zum ersten Mal verwenden, drücken Sie zunächst vorsichtig die eventuell enthaltene überschüssige Luft aus der Tube. Die Tube nach der Verwendung wieder fest verschließen.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller, welcher in dieser Packungsbeilage genannt ist, und der zuständigen Behörde in Ihrem Land zu melden.

Aufbewahrung:

Das Produkt bei 15 - 25 °C und außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verfalldatum ist auf der Tube und auf der Faltschachtel angegeben und bezieht sich auf das sachgemäß gelagerte Produkt. Verwenden Sie das Produkt innerhalb dieses Verfalldatums, dies gilt auch nach dem Öffnen.



Losnummer und Verfalldatum: siehe Faltschachtel und Tube

Entsorgen Sie nach Abschluss der Anwendung die Tube, die Packungsbeilage und den Karton wie gewöhnlichen Hausmüll. Denken Sie an die Umwelt und recyceln Sie.



Serrix BV
Herengracht 458
1017 CA, Amsterdam
Niederlande



Queisser
PHARMA
GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
DEUTSCHLAND
www.doppelherz.de



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

	Hersteller		Vertriebspartner
	Medizinprodukt		Gebrauchsanweisung beachten
	Untere Temperaturbegrenzung 15° C, obere Temperaturbegrenzung 25° C		Vor Sonnenlicht schützen
	Zur Mehrfachanwendung bei einer einzelnen Person		Verwendbar bis
	Chargenbezeichnung		Eindeutige Produktidentifizierung