INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Sprawdź foliowe opakowanie prezerwatywy i znajdującą się na nim datę ważności. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy je wyrzucić i użyć nowego, które jest w idealnym stanie.
- Opakowanie jednostkowe należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem prezerwatywy. Otwórz opakowanie przy krawędzi jednej z ząbkowanych stron opakowania. Czynność tę należy wykonać, przesuwając prezerwatywę w stronę środka opakowania. W żadnym wypadku nie należy używać paznokci, zębów lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić prezerwatywę (patrz rysunek 1).
- Wyjmij ostrożnie prezerwatywę, tak by nie uszkodzić jej krawędziami opakowania, paznokciami, biżuterią lub innymi przedmiotami. Jeśli zauważysz, że prezerwatywa jest uszkodzona, lepka lub ma nietypowe zabarwienie, wyrzuć ją i użyj innej. Jeśli masz rany na dłoniach, unikaj kontaktu z prezerwatywą, aby zmniejszyć możliwość zarażenia.
- Przytrzymaj palcami zbiorniczek prezerwatywy z silikonowym lubrykantem na zewnątrz (A na rysunku 2), aby usunąć powietrze. W ten sposób prezerwatywa łatwo się rozwija, a wewnętrzna strona (B na rysunku 2) zawierająca Benzokainę pozostaje w kontakcie z penisem.
- Umieść prezerwatywę na penisie w stanie wzwodu, wciąż ściskając palcami zbiorniczek (patrz rysunek 3).
- Ostrożnie rozwiń prezerwatywę, aż całkowicie zakryje penisa (patrz rysunek 4). Wykonaj tę czynność przed jakimkolwiek kontaktem penisa z ciałem partnerki, aby zapobiec infekcjom przenoszonym drogą płciową (STI) i ciąży.
- Po stosunku ostrożnie wycofaj penisa, nadal będącego w stanie erekcji. Przytrzymaj krawędź prezerwatywy u nasady penisa, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi nasienia i zsunięciu się prezerwatywy (patrz rysunek 5).
- Zawiąż koniec zużytej prezerwatywy i zawiń ją w chusteczkę. Następnie wyrzuć ją w higieniczny i bezpieczny sposób. Nie wolno wyrzucać prezerwatyw do toalety (patrz rysunek 6).

Podsumowanie bezpieczeństwa i wyników klinicznych można uzyskać pod adresem:
https://unimil.pl/sscp

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Prawidłowe stosowanie prezerwatyw pomaga zapobiegać ciąży i infekcjom przenoszonym drogą płciową (STI). Stosowanie prezerwatyw nie eliminuje ryzyka w całości.
- Należy używać nowej prezerwatywy podczas każdego stosunku lub w przypadku zmiany partnera w jego trakcie. **Prezerwatywa to produkt jednorazowego użytku**. Ponowne użycie prezerwatywy związane jest ze zwiększonym ryzykiem ciąży i infekcji.
- Jeśli potrzebujesz dodatkowego nawilżenia, użyj odpowiedniego lubrykantu, zalecanego do stosowania z prezerwatywami. Nie używaj środków nawilżających (lubrykantów) zawierających tłuszcz takich jak wazelina, oliwka dla niemowląt, balsamy do ciała, olejki do masażu, masło, margaryna itp. Substancje zawierające tłuszcz mogą uszkodzić prezerwatywę.
- Kontakt prezerwatywy z ogolonymi włosami lub kolczykami zwiększa ryzyko jej pęknięcia. Należy podjąć dodatkowe środki ostrożności.
- Prawdopodobieństwo pęknięcia prezerwatywy jest większe, jeśli jest ona używana w inny sposób niż dopochwowo. Należy podjąć dodatkowe środki ostrożności.
- Należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą zgodność prezerwatyw z produktami stosowanymi miejscowo w okolicach intymnych.
- Nie stosować przez osoby uczulone na lateks, ponieważ może on powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny - jeśli osoba jest uczulona na lateks. W takich przypadkach należy używać prezerwatyw bezlateksowych. Jeśli wystąpi jakakolwiek reakcja alergiczna, należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania odpowiednich wskazówek.
- Jeśli podczas stosunku zauważysz, że prezerwatywa zsuwa się lub zbyt mocno się rozciąga, sprawdź jej stan aby uniknąć jej potencjalnego pęknięcia.
- W przypadku pęknięcia prezerwatywy, zsunięcia się z penisa lub wycieku podczas jej stosowania należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną (w ciągu 72 godzin).
- W przypadku jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego z tym produktem należy powiadomić producenta i właściwy organ w swoim kraju.



IFU rev 01/25

OSTRZEŻENIE: PRODUKTY ZAWIERAJĄCE BENZOKAINĘ

- Ten produkt zawiera Benzokainę (4,5%). Substancja opóźniająca.
- Po użyciu umyć penisa, aby usunąć wszelkie ślady Benzokainy.
- Unikać kontaktu z oczami.
- Ten produkt nie powinien być używany, jeśli u któregokolwiek z partnerów wystąpi stan zapalny lub uszkodzenie skóry po kontakcie z prezerwatywą.
- Jeśli u któregokolwiek z partnerów wystąpi wysypka lub podrażnienie, należy skontaktować się z lekarzem.
- Benzokaina może powodować methemoglobinemię. Jeśli u któregokolwiek z partnerów wystąpią zaburzenia oddychania lub sine usta podczas stosowania tego produktu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i nie używać produktu ponownie.
- **Nie używaj prezerwatyw z Benzokainą, jeśli:**
  - Wiesz, że masz genetyczne predyspozycje do wystąpienia methemoglobinemii.
  - Przyjmujesz dapson, nitrogliceryny, sulfonamidy, trimetoprim lub inne substancje, które mogą wywoływać methemoglobinemię.
  - Kiedykolwiek wystąpiła u ciebie reakcja immunologiczna na miejscowy środek znieczulający, sulfonamidy lub PABA (kwas para-aminobenzoesowy). Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na miejscowe środki znieczulające lub osoby z zapaleniem skóry.
- Prezerwatywy z Benzokainą należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przedwczesny wytrysk wymaga konsultacji lekarskiej.
- Jeśli ten produkt stosowany zgodnie z zaleceniami nie daje pożądanego efektu opóźniającego, należy używać prezerwatywy bez Benzokainy.

UWAGA: Należy unikać używania następująco po sobie prezerwatyw z Benzokainą, ponieważ efekt znieczulający może stać się nadmierny. Umyj penisa, jeśli prezerwatywa zostanie zdjęta, a kontynuujesz uprawianie seksu, aby uniknąć działania znieczulającego na inne części ciała (np. w przypadku seksu oralnego po użyciu prezerwatywy). Produkt nie jest przeznaczony do seksu oralnego. Benzokaina może powodować znieczulenie jamy ustnej / języka podczas kontaktu oralnego.

- Produkt jednorazowego użytku
- Producent
- Ostrzeżenia
- Należy zapoznać się z instrukcją użycia
- LOT Numer partii
- Data ważności
- CE 2797 Produkt certyfikowany. Spełnia wymogi rozporządzenia UE 2017/745
- LATEX Zawiera naturalny lateks
- Zawiera substancję leczniczą
- MD Wyrób medyczny
- REF Numer katalogowy
- THIS SIDE UP Otworzyć folię tą stroną do góry
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Black