ARTWORK – INNER

LifeStyles SINCE 1905

FILE INFORMATION

Description: SKYN 10 IFU inner

Dieline: New dieline glued - no cello wrapping

Market: POLAND

Size: 63mm x 37mm x 124mm


Support: Recycled cardboard

PK: /

Date Work Performed: 10/06/26

Colors Used:

Black



INSTRUKCJA UŻYCIA PREZERWATYW NIELATEKSOWYCH DLA MĘŻCZYZN

Przeznaczenie: W celach antykoncepcyjnych oraz jako pomoc w ochronie przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową.

Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Produkt należy przechowywać w suchym i „chłodnym miejscu, oraz chronić przed działaniem światła słonecznego. Należy zawsze sprawdzić datę ważności podaną na foliowym opakowaniu prezerwatywy. Nie używaj prezerwatywy, jeśli termin jej ważności minął lub jeśli opakowanie jest wyraźnie uszkodzone. Użyj prezerwatywy z innego opakowania, bez uszkodzeń.

1. Otwórz opakowanie i delikatnie wyjmij prezerwatywę. Prezerwatywy są wytrzymałe, ale mogą zostać uszkodzone ostrymi paznokciami, zębami lub biżuterią. Nigdy nie używaj więcej niż jednej prezerwatywy naraz. Zawsze zmieniaj prezerwatywę między partnerami i aktami seksualnymi, np. waginalnymi, oralnymi lub analnymi, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia HIV i STI.
2. Prezerwatywę zawsze zakładaj na penisa, zrolowaną częścią na zewnątrz, przed jakimkolwiek kontaktem seksualnym i wyłącznie wtedy, gdy penis jest w stanie erekcji. Zmniejszy to ryzyko nieplanowanej ciąży oraz zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową.
3. Prezerwatywę można rozwinąć tylko w jednym kierunku. Nie należy całkowicie rozwijać prezerwatywy przed jej użyciem. Sprawdź, czy prezerwatywa po rozwinięciu ma zrolowaną część po zewnętrznej stronie.
4. Ściśnij końcówkę prezerwatywy, aby wypchnąć zgromadzone w niej powietrze i zrobić miejsce na spermę. Pozostawienie powietrza w prezerwatywie może zwiększyć ryzyko jej uszkodzenia.
5. Rozwiń prezerwatywę na całą długość penisa, aż do jego nasady. Jeśli prezerwatywa nie rozwija się łatwo, może to oznaczać, że jest zakładana odwrotnie, jest uszkodzona albo stara. Należy wówczas ją wyrzucić i użyć nowej prezerwatywy. Jeśli poczujesz, że prezerwatywa zsuwa się lub zbytnio rozciąga, przerwij zakładanie i sprawdź ją, aby uniknąć potencjalnego pęknięcia.
6. Nie używaj środków nawilżających (lubrykantów) zawierających tłuszcz, takich jak olejek do masażu, balsam do ciała, oliwka dla dzieci, masło, margaryna, wazelina itp. Wszystkie substancje zawierające tłuszcz mogą uszkodzić prezerwatywy z poliizoprenu. Używaj wyłącznie środków nawilżających nadających się do stosowania z prezerwatywami poliizoprenowymi. Stosowanie niektórych leków może powodować uszkodzenia prezerwatyw, dlatego zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7. Po stosunku ostrożnie wycofaj penisa, nadal będącego w stanie erekcji. Przytrzymaj krawędź prezerwatywy u nasady penisa, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi nasienia. Skieruj penisa w dół i ostrożnie zsuń z niego prezerwatywę.
8. Zawiąż koniec zużytej prezerwatywy i zawiń ją w chusteczkę. Następnie wyrzuć ją w higieniczny sposób. Nie wolno wyrzucać prezerwatyw do toalety.

PREZERWATYW NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO JEDEN RAZ. Do zagrożeń związanych z ponownym używaniem prezerwatyw należą wzajemne zakażenie, rozdarcie oraz utrata nawilżenia i wytrzymałości ze względu na czyszczenie, co zwiększa ryzyko ciąży oraz zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prezerwatywy SKYN® są wykonane z poliizoprenu. Prezerwatywy SKYN® nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego i mogą być stosowane przez osoby ze stwierdzoną lub możliwą alergią na naturalny lateks.

UWAGA: U szczególnie wrażliwych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki użyte w tych prezerwatywach. W przypadku wystąpienia takiej reakcji, wysypki, podrażnienia lub uczucia pieczenia, należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Prawidłowe stosowanie prezerwatyw pomaga obniżyć ryzyko ciąży, zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz HIV/AIDS. Prezerwatywy są skuteczną barierą zapobiegającą ciąży oraz rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych drogą płciową, jednak tak jak w przypadku wszystkich środków antykoncepcyjnych, nie można zagwarantować 100-procentowej ochrony. Inne stosowanie prezerwatyw niż dopochwowe - seks oralny (podczas którego zęby mogą uszkodzić prezerwatywę) oraz seks analny (podczas którego może zabraknąć naturalnej lubrykacji) - może zwiększyć ryzyko ich zsunięcia się lub uszkodzenia. W razie współżycia bez zabezpieczenia lub obaw, co do nieskuteczności stosowanej metody antykoncepcji jak najszybciej (w ciągu 72 godzin) skontaktuj się z lekarzem lub przychodnią planowania rodziny.

RU REVISION 06/26

MD Wyrób medyczny: każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Podmiot odpowiedzialny za produkcję

Kraj produkcji

EU REP Upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej

LOT Numer partii

REF Numer referencyjny

Importer : Unimil Sp. z o.o. ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, Poland