tetesept:

Dornwarzen Pflaster Intensiv

Medizinprodukt

Selbstklebende Wirkstoffpunkte mit Salicyl- und Milchsäure und Druckschutzpflaster zur Schmerzlinderung und örtlichen Behandlung von Dornwarzen.

Durch das Tag und Nacht Konzept wird die Dornwarze wirksam entfernt und die umliegende Haut geschützt. Die Wirkstoffpunkte entfernen durch die hautschälende Wirkung von Salicyl- und Milchsäure die Dornwarze effektiv und gezielt. Die Druckschutzpflaster lindern den Druckschmerz, schützen vor Infektionsausbreitung und bieten sicheren Halt.

Anwendung:
Die Behandlung erfolgt in 2 Schritten (empfohlene Anwendungsdauer 7 – 14 Tage).

Tagsüber: Tag-Wirkstoffpunkt & Druckschutzpflaster

Schritt 1: Morgens entfernen Sie einen Tag-Wirkstoffpunkt vom Trägerpapier und kleben diesen direkt auf die Dornwarze. Wir empfehlen das Aufkleben nach dem Duschen oder einem warmen Fußbad.

Schritt 2: Entfernen Sie ein Druckschutzpflaster vom Trägerpapier und fixieren damit den Wirkstoffpunkt auf der betroffenen Stelle. Fest andrücken, damit das Pflaster sicher haftet.

❶



❷



Nachts: Nacht-Wirkstoffpunkt
Entfernen Sie vor dem Schlafengehen das Druckschutzpflaster und den Tag-Wirkstoffpunkt. Kleben Sie einen atmungsaktiven Nacht-Wirkstoffpunkt auf die Warze:

① Entnehmen Sie dafür die Trägerfolie mit dem sich darauf befindlichen Nacht-Wirkstoffpunkt aus der Verpackung.



② Die Trägerfolie ist unter dem Wirkstoffpunkt perforiert. Lösen Sie zuerst das größere Stück der transparente Trägerfolie vom Wirkstoffpunkt, indem Sie dieses vorsichtig nach unten abziehen.



③ Kleben Sie nun den zur Hälfte freigelegten Wirkstoffpunkt auf die Warze und drücken Sie diesen gut fest.



④ Ziehen Sie nun den kürzeren Teil der transparenten Trägerfolie vorsichtig ab, um den Wirkstoffpunkt komplett zu platzieren. Drücken Sie nun den Wirkstoffpunkt nochmals gut fest und entfernen Sie anschließend die blaue Schutzfolie.



Hinweise:
- Nur zur Anwendung auf Dornwarzen.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Nicht auf geröteter oder verletzter Haut anwenden.
- Bei Hautirritationen Anwendung sofort abbrechen.
- Diabetiker, Menschen mit Blutzirkulationsstörungen, schwangere oder stillende Frauen und Kinder unter 16 Jahren sollten vor der Anwendung einen Arzt zu Rate ziehen.
- In der Originalverpackung an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Enthält 35 % Salicylsäure und 2,1 % Milchsäure.
- Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 7 – 14 Tage. Falls die Warze nicht vollständig entfernt wurde, kann der Behandlungszyklus wiederholt werden. Die maximale Anwendungsdauer sollte 12 Wochen nicht überschreiten.
- Bitte informieren Sie den Hersteller oder die zuständige Behörde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte; www.bfarm.de), wenn mit dem Medizinprodukt schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten sollten.

Inhalt: 12 Tag-Wirkstoffpunkte, 12 Nacht-Wirkstoffpunkte, 12 Druckschutzpflaster, Gebrauchsanweisung.

Zusammensetzung: Salicylsäure 35 %, Milchsäure 2,1 %

Hersteller:
Eurosirel S.P.A.
Viale Europa, 30
20047 Cusago (MI)
Italy

Vertrieb:
MERZ LIFECARE
Merz Consumer Care GmbH
Eckenheimer Landstraße 100
60318 Frankfurt am Main
www.tetesept.de

Überarbeitung:
Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im Dezember 2024 überarbeitet.

Art. Nr. 75152

CE 0051 MN 180002664